

Coloquio Nacional de Investigación de Enfermería

Enfermería y posconflicto:
cuidado para la salud y la calidad de vida

Memorias

Coloquio Nacional de Investigación de Enfermería

Enfermería y posconflicto:
cuidado para la salud y la calidad de vida

Memorias

Coloquio Nacional de Investigación de Enfermería

Memorias del XXIII Coloquio

1ª edición, diciembre de 2017

ISSN: 2463-2341 (Digital)

® Universidad El Bosque

Rector: Rafael Sánchez París

Vicerrectora Académica: María Clara Rangel Galvis

Vicerrector de Investigaciones: Miguel Otero Cadena

Vicerrector Administrativo: Francisco José Falla

Decana Facultad de Enfermería:

Rita Cecilia Plata de Silva

Editorial Universidad El Bosque

Dirección: Av. Cra 9 n°. 131A-02, Torre D, 4.º piso

Teléfono: +57 (1) 684 9000, ext. 1395

editorial@unbosque.edu.co

www.uelbosque.edu.co/editorial

Editor jefe: Gustavo Silva

Coordinación editorial: Laidy De Ávila Castro

Diseño y diagramación: María Camila Prieto Avello

Corrección de estilo: Liliana Ortiz

Diciembre de 2017

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni total ni parcialmente, ni entregada o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sin la autorización previa de los titulares de los derechos de autor.

Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (Acofaen)

Junta Directiva

Renata Virginia González Consuegra
Presidenta de ACOFAEN, Profesora Universidad Nacional de Colombia

Fabiola Castellanos Soriano

Vicepresidenta, Pontificia Universidad Javeriana

Sandra Patricia Carmona Uruña

Vicepresidenta (s), Universidad de Cundinamarca

Óscar Alberto Beltrán Salazar

Secretario, Universidad de Antioquia

Dolly Magnolia González Hoyos

Secretaria (s), Universidad de Caldas

María Alejandra Orostegui Santander

Vocal 1, Universidad Simón Bolívar

Edna Gómez Bustamante

Vocal 2 (s), Universidad de Cartagena

Nelly Esperanza Jaimes Carvajal

Vocal 2, Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Bucaramanga

Guadalupe Arnedo Franco

Vocal 1 (s), Universidad Metropolitana

Comité Científico del XXIII Coloquio Nacional de Investigación de Enfermería

Miguel Antonio Sánchez Cárdenas

Director del XXIII Coloquio Nacional de Investigación de Enfermería, Profesor asociado Universidad El Bosque

Lina María Vargas Escobar

Universidad El Bosque

Carolina Gutiérrez López

Universidad El Bosque

Martha Cecilia López Maldonado

Universidad El Bosque

Carmen Lucía Niño Cardozo

Pontificia Universidad Javeriana

Maryory Guevara Lozano

Universidad de La Sabana

Olga Rocío Gómez Ortega

Fundación Universitaria Sanitas

Adriana Merchán Restrepo

Fundación Santa Fe de Bogotá

ÍNDICE

/14 PRESENTACIÓN

/16 XXIII COLOQUIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMERÍA. ENFERMERÍA Y POSCONFLICTO: CUIDADO PARA LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA

/20 CONFERENCISTAS INVITADOS

/22 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADOS

CATEGORÍA: CUIDADO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

- / 23 Tiempo de vida útil de un acceso venoso periférico corto en niños
- / 23 Satisfacción usuaria según determinantes sociales, en cuidadores de pacientes pediátricos
- / 24 Técnicas de recolección de muestra de orina en pediatría. Revisión de la literatura
- / 24 Significados que hombres adolescentes le atribuyen a la experiencia de embarazar y ser padres
- / 25 Experiencia vivida por el niño hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en relación con el cuidado recibido
- / 25 Mitos sobre la sexualidad en adolescentes escolarizados de la Comuna 4 de Valledupar
- / 26 Prácticas y saberes del cuidado de la salud en niños indígenas: una perspectiva desde la etnia guambiana
- / 26 Cambios en las condiciones, trayectorias y proyectos de vida de los jóvenes en situación de desplazamiento asentados en Bogotá
- / 27 Intervenciones de enfermería para adolescentes con sobrepeso y obesidad
- / 28 Intervenciones de enfermería a gestante adolescente con disposición para mejorar el proceso de maternidad
- / 28 Criterios para evaluar la evitabilidad de reacciones adversas a medicamentos en pediatría. Una revisión integradora de la literatura
- / 29 Estilos de vida relacionados con factores de riesgo cardiovascular en estudiantes de una institución educativa

CATEGORÍA: ÉTICA Y BIOÉTICA

- / 30 Tensiones bioéticas y principios aplicables en Misión Médica: ¿existen límites al cumplimiento del deber?

**CATEGORÍA: CUIDADO DE LA PERSONA
CON ENFERMEDAD CRÓNICA**

- / 30 Uso de las TIC para promover la autogestión en la prevención de úlceras por pie diabético
- / 31 Evidencias de validez y confiabilidad de la versión colombiana del cuestionario Disabkids para medir calidad de vida relacionada con la salud en niños y adolescentes con enfermedad crónica. Versión niños
- / 31 Incertidumbre en trauma raquímedular a partir de la teoría Merle Mishel
- / 32 La práctica clínica: un escenario para la enseñanza y el aprendizaje del cuidado del paciente con enfermedad crónica
- / 32 Supervivencia de los pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio y alto, en el Hospital Militar Central en el periodo 2008-2014
- / 33 Validez y confiabilidad del instrumento de calidad de vida de Betty Ferrell, para personas con enfermedad crónica
- / 33 Implementación de protocolo de seguimiento al paciente oncológico que recibe quimioterapia por primera vez, con el fin de modular su nivel de incertidumbre
- / 34 Percepción psicosocial del paciente con enfermedad renal crónica en una institución de salud de Barranquilla
- / 34 Vivir con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- / 35 Instrumento competencia para el cuidado (Cuidar) en el hogar: diseño y validación
- / 35 Aplicación telefónica para promover la adherencia al autocateterismo vesical intermitente en personas con vejiga neurogénica
- / 36 Un weblog para el cuidado de la piel
- / 36 Modelo de ecuaciones estructurales en calidad de vida de personas con artritis reumatoide
- / 37 Espiritualidad en cuidadores familiares de niños con cáncer en Cartagena de Indias
- / 37 Proceso de adaptación de un grupo de pacientes adultos en condición de discapacidad atendidos en la consulta de enfermería en rehabilitación
- / 38 Evaluación de las úlceras por presión por medio de registros fotográficos. Un aporte a la evidencia
- / 38 Cuidados de Enfermería en el menor de edad con hemofilia
- / 39 Competencia de los cuidadores de enfermos crónicos en una institución prestadora de servicio (IPS) de Cúcuta
- / 39 Percepción de la calidad de vida en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles
- / 40 Película transparente estéril para la fijación de acceso venoso periférico: experiencia de su implementación en servicios hospitalarios
- / 40 Vivencias del paciente al momento de recibir el diagnóstico de cáncer

CATEGORÍA: CUIDADO AL PACIENTE EN SITUACIÓN AGUDA Y CRÍTICA

- / 41 Hiperglicemia de estrés y resultados adversos en pacientes críticos adultos. Clínica La Estancia, Popayán 2016-2017
- / 42 Adaptación transcultural, validez y confiabilidad del instrumento ASTA (Arrhythmia-Specific Questionnaire in Tachycardia and Arrhythmia)
- / 43 Estresores en cuidado intensivo: percepción del paciente
- / 43 Impacto entre el uso de apósitos hidrocoloides en cuidado preventivo y el desarrollo de úlceras por presión en pacientes de alto riesgo: estudio de cohorte
- / 44 Factores asociados con infección por acinetobacter baumannii en una unidad de cuidados intensivos de Bogotá D. C.
- / 44 Implementación de un comité de calidad del cuidado en Enfermería en la Clínica Sotomayor del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, Ecuador, 2017-2018

CATEGORÍA: SALUD MENTAL

- / 45 Salud mental en desplazados por la violencia, basada en el Modelo de Enfermería Roper-Logan-Tierney, Cartagena 2016
- / 45 Atención psicosocial a víctimas del conflicto armado colombiano, una revisión sistemática
- / 46 Salud mental colectiva: impactos en población afectada por el conflicto armado. Caldono, Cauca, 2017
- / 46 El rol de la crianza parental y el ajuste psicosocial en adolescentes consumidores de drogas
- / 47 Efecto terapéutico de la música en estudiantes de Enfermería
- / 48 La historieta-fanzine como una herramienta de rehabilitación de base comunitaria en una población con trastorno mental severo (TMS)
- / 48 Experiencia pedagógica: Cuidado de la salud mental en el contexto penitenciario según el enfoque del modelo de resignificación del cuidado. Yopal, 2017
- / 48 Uso de internet, consumo de alcohol y funcionalidad familiar en adolescentes de secundaria
- / 49 Caracterización del Síndrome de Burnout en profesionales de Enfermería en unidades de cuidados intensivos de América Latina
- / 44 Perfil de los cuidadores de pacientes admitidos en el Hospital Psiquiátrico
- / 50 Estrés académico en estudiantes de Enfermería de una universidad de Cúcuta
- / 50 Estrategia pedagógica con tecnologías multimedia para promover la salud mental en estudiantes del área de la salud

CATEGORÍA: EDUCACIÓN EN SALUD Y ENFERMERÍA

- / 51 Influencia de la formación profesional en el autocuidado de estudiantes de Enfermería colombianos. 2015-2016
- / 52 Salud sexual y reproductiva en estudiantes universitarios: más allá del conocimiento y las prácticas
- / 53 Diseño de un objeto virtual de aprendizaje para disminuir la incidencia de infecciones asociadas con una mala técnica en la inserción de catéter urinario
- / 53 Amorizar el cuidado como camino en la salud para ser aplicado en la formación de Enfermería
- / 53 Satisfacción de simulación de competencias no técnicas en alumnos de cuarto año de la Universidad de los Andes, Santiago de Chile
- / 54 Factores que influyen en la configuración de la identidad “profesional enfermera”
- / 54 Modelo teórico: “Enseñando el cuidado humano como un proceso complejo de interacciones vivenciadas, compartidas y reconocidas en la práctica”
- / 55 Factores socioculturales asociados con la interrupción de la lactancia materna exclusiva en madres con niños menores de seis meses. Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2017
- / 55 Reconocimiento de acciones de resistencia a las identidades binarias de género y sexuales, de las personas en escenarios de exclusión
- / 56 Niveles de cumplimiento de las competencias desarrolladas en los estudiantes de Enfermería para el cuidado de la mujer durante la gestación, el parto y el puerperio
- / 56 Factores de deserción de los estudiantes de Enfermería de la Universidad Surcolombiana: cohortes 2012 a 2015
- / 57 Estilos de aprendizaje: un paso para el mejoramiento en la educación de Enfermería
- / 57 Educar para la convivencia: una experiencia en el contexto de la formación de profesionales de Enfermería
- / 58 Caracterización del aprendizaje del cuidado humanizado en estudiantes de tercer año de la carrera de Enfermería de la Universidad de Santiago de Chile

CATEGORÍA: CUIDADOS PALIATIVOS

- / 58 Calidad de vida y soporte social en los cuidadores familiares de personas con cáncer en tratamiento paliativo
- / 59 Nivel de funcionalidad de familias con un integrante con enfermedad crónica no transmisible avanzada
- / 59 Cuidados paliativos de Enfermería para el manejo del dolor del paciente en hemodiálisis

CATEGORÍA: SALUD PÚBLICA

- / 60 Comportamientos saludables en una comunidad
- / 60 Prácticas y sentidos en el uso del preservativo en jóvenes universitarios de Cali
- / 61 Adherencia al tratamiento en pacientes con nefritis lúpica con edades entre 18 y 55 años, de la región Caribe colombiana
- / 61 ¿Qué esperan los padres o cuidadores de la red de apoyo frente a la situación de abuso sexual de un hijo?
- / 62 Condiciones de seguridad alimentaria y nutricional del resguardo indígena Tama-Páez La Gabriela. Neiva, 2017
- / 62 Factores que afectan la seguridad del paciente en las unidades de cuidados intensivos de tres instituciones de salud
- / 63 El conflicto armado colombiano y los resultados en mortalidad materna e infantil
- / 63 Comparación de las actitudes hacia la sexualidad en la vejez. Cartagena, 2015
- / 64 Consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de una institución universitaria. Pereira, 2016
- / 64 Epidemiología de lesiones de piel en Colombia
Cumplimiento del lavado de manos en personal de salud en cuidados intensivos. Barranquilla, 2016
- / 65 Sistema de creencias en relación con el uso y las consecuencias del cannabis: consumidores vs. no consumidores en una universidad de Colombia
- / 66 Adherencia al tratamiento de Montelukast más antihistamínicos orales para la rinitis alérgica. Revisión sistemática
- / 66 Reflexión del conflicto armado en Colombia: acuerdos y avances de una esperanza de paz
- / 67 Prevalencia de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de cinco años del Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, de Venustiano Carranza, 2017

CATEGORÍA: CULTURA Y CUIDADOS

- / 67 Cultura del consumo informado de bebidas energizantes en jóvenes estudiantes de una institución de educación superior de Bogotá
- / 68 Creencias y prácticas de cuidado cultural de gestantes pertenecientes a la comunidad indígena Wayúu
- / 68 Aproximación a un modelo de cuidado. Mejorar la experiencia de la salud humana: cuidado de Enfermería a partir de los saberes
- / 69 Relaciones y prácticas de género en un grupo de estudiantes universitarios de una facultad de salud en Cali, Colombia

- / 69 Proceso salud-enfermedad que tienen los integrantes de la comunidad indígena Gran Tesqual, en Puerres, Nariño
- / 70 Efecto de un programa de cuidado cultural en el apoyo social de adultos mayores con discapacidad, Facatativá, Cundinamarca
- / 70 Prácticas del personal de salud y de las mujeres durante el proceso de atención del embarazo, parto y puerperio: la integralidad y la humanización en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. de Bogotá - Localidad de Usaquén
- / 71 Significado de las vivencias de los pacientes adultos que fueron sometidos a cirugía bariátrica en la Clínica San José entre 2009 y 2012
- / 71 Mapa de la investigación iberoamericana: recursos, estrategias y limitaciones

CATEGORÍA: MODELOS Y TEORÍAS DE ENFERMERÍA

- / 72 Cuidado de Enfermería en el manejo del dolor de la gestante sorda, mediada por TIC
- / 72 Compromiso y tono humano en el cuidado de Enfermería: un modelo funcional
- / 73 Aplicación del procedimiento al ingreso del paciente por el profesional de Enfermería. Emergencia. Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde, 2016-2017

CATEGORÍA: CUIDADO A LA MUJER

- / 73 Sobrecarga generada por el rol en cuidadores de personas con alteraciones cognitivas que consultan a una clínica de memoria
- / 74 Factores psicosociales influyentes en la toma de decisiones de la mujer con síntomas coronarios: revisión integrativa de la literatura
- / 74 Opiniones de los estudiantes de Enfermería sobre la sentencia C-355 de 2006
- / 75 Significado que los adolescentes hombres le dan a su participación en el uso de métodos anticonceptivos en Bogotá y Medellín
- / 75 Eficacia de una estrategia de manejo de los síntomas de enfermedad coronaria en la mujer
- / 76 Salud sexual y reproductiva en mujeres víctimas del conflicto armado en Popayán, Cauca, 2017
- / 76 Interrupción voluntaria del embarazo: experiencias de vida
- / 77 Atención de Enfermería en salud mental a mujeres víctimas de violencia sexual: una revisión sistemática
- / 77 Significado que las púerperas le asignan a la experiencia de una gestación con preeclampsia
- / 78 El papel de la violencia doméstica contra la mujer en la ocurrencia de las muertes maternas en Bogotá D. C.
- / 78 Percepciones frente al cuidado de mujeres que vivieron situaciones de morbilidad materna extrema

- / 79 Caracterización de los síntomas de angina en mujeres hospitalizadas en la Clínica San Juan de Dios de Cartagena
- / 79 Conocimientos que tiene el personal de Enfermería sobre la lactancia materna (LM) en el servicio de Obstetricia de una clínica privada de Medellín
- / 80 Rol de la Enfermería frente a la violencia obstétrica durante el trabajo de parto, el parto y el posparto inmediato
- / 80 Preparación para la maternidad durante la gestación. Un análisis de concepto
- / 81 Las prácticas de las enfermeras durante la atención a la mujer en el trabajo de parto
- / 81 Factores familiares asociados con los conocimientos y la frecuencia correcta del autoexamen de mama en mujeres del área rural de Cartagena
- / 82 Experiencia de las mujeres primíparas en la atención del parto institucionalizado

CATEGORÍA: CUIDADO AL RECIÉN NACIDO

- / 83 Significado del cuidado materno cultural del niño con oxígeno domiciliario

CATEGORÍA: ADMINISTRACIÓN EN SALUD Y ENFERMERÍA

- / 83 Percepción de la cultura en seguridad del paciente en una unidad de atención de Bogotá
- / 84 Factores asociados con las caídas de pacientes hospitalizados con enfoque en el cuidado de Enfermería en tres hospitales colombianos de alta complejidad entre 2014 y 2016
- / 84 Comportamiento de la resistencia de *Acinetobacter* spp. a carbapenémicos tipo Meropenem y medidas de contención a lo largo del tiempo en el Hospital Universitario San Ignacio
- / 85 Percepción de los usuarios acerca de la calidad en la atención de Enfermería
- / 85 Calidad de los registros de Enfermería: estructura, continuidad del cuidado y seguridad del paciente de expedientes clínicos de queja médica

CATEGORÍA: CONDICIONES DE TRABAJO

- / 86 Síndrome de Burnout en el personal de Enfermería de hospitales del Atlántico
- / 87 Rol de los profesionales de Enfermería en el sistema de salud colombiano

CATEGORÍA: CUIDADOS PERIOPERATORIOS

- / 88 Prevalencia de cirugías realizadas, causas, reingresos y mortalidad en un hospital de tercer nivel de Colombia

PRESENTACIÓN

Rita Cecilia Plata de Silva

Decana Facultad de Enfermería

Universidad El Bosque

En la celebración de los 40 años de la Universidad El Bosque y los 16 años del Programa de Enfermería, es muy grato para la Institución ser la sede para el desarrollo del “XXIII Coloquio Nacional de Investigación de Enfermería. Enfermería y posconflicto: cuidado para la salud y la calidad de vida”, a realizarse en colaboración con la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (Acofaen).

Las conferencias de este coloquio fueron desarrolladas por un selecto grupo de invitados nacionales e internacionales, a quienes de antemano les agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Asimismo agradecemos al equipo científico conformado por enfermeros de las universidades de La Sabana, Sanitas, Javeriana, El Bosque y la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Previo al Coloquio se desarrollaron algunas actividades de alto interés académico y científico, como el “IV Encuentro de Enfermeros y Enfermeras con formación Doctoral” —con temas sobre investigación y proyección de la Enfermería en Colombia de acuerdo con los avances globales de la salud en el mundo— y los talleres precoloquio sobre diferentes asuntos de salud que atañen a la Enfermería.

Para la Universidad El Bosque es gratificante ser la sede organizadora del Coloquio por varias razones, entre ellas celebrar los 40 años de una institución con acreditación de alta calidad, reconocida en investigación por sus productos, que la posicionan en el octavo puesto del país y en el quinto de Bogotá.

Otra razón son los 16 años de la creación de la Facultad de Enfermería, la cual —en tan corto tiempo de existencia— ha alcanzado logros importantes, como los que se citan continuación:

- Programa de Enfermería con acreditación de alta calidad.
- Grupo de investigación en categoría B de Colciencias.

- Producción de artículos, libros y capítulos de libros del grupo de profesores.
- Revista Colombiana de Enfermería. Volumen 14.
- Tres programas de maestrías: Salud Sexual y Reproductiva, Salud Mental Comunitaria y Enfermería en Cuidados Paliativos.
- Tres programas de especializaciones: Enfermería Neonatal; Seguridad del paciente presencial, seguridad del paciente virtual, y B learning.
- Primer y único Observatorio en Cuidados Paliativos de Colombia y de Latinoamérica.
- Fortalecimiento de la internacionalización por medio de convenios y eventos con invitados internacionales de lengua diferente al español; movilidad internacional; manejo de una segunda lengua por parte de profesores y estudiantes.
- Convenios nacionales en diferentes áreas de Bogotá y Cundinamarca.
- Diseño del “Modelo de prestación de servicios de enfermería centrados en la persona y su familia”, con el fin de desarrollarlo en el hospital que está construyendo la Universidad y que iniciará actividades a finales del próximo año.
- Profesores con especialización, maestría y doctorado.
- Participación activa de profesores en diferentes redes de investigación.
- Pertenencia a diferentes asociaciones, entre ellas la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (Acofaen) y la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería (Aladefe).

Solo resta agradecer al equipo de la Facultad de Enfermería, profesores, estudiantes de pregrado y posgrado y personal administrativo, pues sin ellos no hubiésemos conseguido estos logros.

Igualmente a las directivas de la Universidad, que han creído en la Facultad y en los programas generados en ella y la han apoyado incondicionalmente en lo académico, administrativo y financiero.

Creo firmemente que los conocimientos adquiridos o consolidados en el Coloquio nos llevarán a seguir trabajando por la salud y calidad de vida de los colombianos, y por una Colombia unida y en paz; paz que debe ser generada desde nuestro interior, el interior de nuestros hogares, y en comunidad con todas las personas que nos rodean, en cada uno de nuestros actos.

XXIII Coloquio Nacional de Investigación de Enfermería

Enfermería y posconflicto:
cuidado para la salud
y la calidad de vida

Renata Virginia González Consuegra

Presidenta de ACOFAEN.

Profesora Universidad Nacional de Colombia

Acofaen celebra su quinta década como organización pionera en pro de la excelencia académica en la formación del profesional de la Enfermería para nuestro país, y comprometida con la calidad, la cual es viable con el ejercicio de la investigación en la cotidianidad del proceso formativo. En este marco, hace 37 años Acofaen celebró el Primer Coloquio Nacional de Investigación de Enfermería, con el tema de “Enfermería en epidemiología”, emulando a nuestra Florence Nightingale, enfermera, investigadora, teórica y líder en el uso de métodos epidemiológicos y estadísticos. En esa oportunidad este primer coloquio fue organizado por la Universidad del Valle, en Cali; ocho años después, desde Acofaen se dio origen a los Coloquios Panamericanos de Investigación de Enfermería, siendo el primero en Bogotá, al unísono con los VII y VIII Coloquios Nacionales de Investigación.

Las siguientes versiones se han realizado a lo largo y ancho del país con intervalos bianuales; sus temas han sido variados, y en ellos se han socializado los resultados de investigaciones que con el pasar del tiempo se han convertido en termómetro de la evolución y el desarrollo de la disciplina de la Enfermería en Colombia. Siempre se ha contado con invitados y pares internacionales, de modo que sus aportes a los programas de Enfermería al cuidado de la salud en nuestro país han respondido a la realidad social y cultural.

Es así como el XXIII Coloquio Nacional de Investigación de Enfermería, cuyo tema es “Enfermería y posconflicto: cuidado para la salud y la calidad de vida”, hace referencia al proceso social y político actual que vivimos y que como enfermeros colombianos debemos comprender y abordar para contribuir de manera real al cambio hacia una paz estable y duradera.

En febrero de 2015, autores de la Comisión Histórica (2015) le atribuyen el origen del conflicto armado y social colombiano a

los procesos acaecidos a partir de la década de los años veinte del siglo XX, relacionados con enfrentamientos violentos a raíz de la lucha por la tierra ya que la tenencia de la misma está directamente relacionada con tres necesidades básicas: vivienda, alimentación y trabajo/ingreso.

Estos determinantes aspectos fueron considerados en 1978 durante la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Almá-Atá (antigua URSS, hoy Kazajistán) —agenciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)—, en la que se planteó la “atención primaria de salud” como estrategia para lograr un mejor nivel de salud de los pueblos; por eso su lema fue “Salud para todos en el año 2000”. Este evento de política de salud mundial marcó un hito y se convirtió en derrotero como medio para proporcionar una solución general: el acceso a la salud debe ser universal, y la atención sanitaria equitativa y accesible para todos los países (Magnussen, Ehiri y Jolly, 2004).

Es claro entonces que la atención primaria en salud (APS) está relacionada con el afán de suplir necesidades básicas como alimentación; educación; ingresos; vivienda; agua potable; saneamiento básico; conservación del ambiente físico y natural; justicia y equidad social; seguridad ciudadana; alegría; paz; convivencia y democracia, es decir la etiología misma del conflicto colombiano, que por falta de voluntad política, de reconocimiento y de voluntad de diálogo; aunado a la debilidad institucional, a las políticas neoliberales que menguaron considerablemente al campesinado, al narcotráfico, a la falta de pluralismo político y al auge de la contrainsurgencia, generó desconfianza entre el Estado y la guerrilla, lo que truncó once procesos de paz en el país.

Ante el incumplimiento de la meta “Salud para todos en el año 2000”, entre el 6 y 8 de septiembre de 2000 los jefes de Estado y de Gobierno de 189 países se reunieron en la Sede de la ONU en Nueva York y respaldaron la iniciativa “APS Renovada” impulsada tanto por movimientos sociales —como

por ejemplo “Por la salud de los pueblos”— como por académicos e instituciones articuladas con la OPS y la OMS, y reivindicaron los compromisos de Almá-Atá, mediante la creación por Naciones Unidas de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, para reafirmar la fe en la Organización y su Carta como cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo (Magnussen, Ehiri y Jolly, 2004).

Es entonces cuando se acuerda un conjunto de metas y objetivos mundiales, medibles y con plazos fijos a 2015, cuyo abordaje pretende desde reducir a la mitad la extrema pobreza hasta acabar con la difusión del VIH/sida; dar educación primaria a todos; combatir la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la mujer. Estos propósitos fueron denominados como Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Mientras que en Colombia desde la Ley 100 de 1993 se dejó de hablar de APS y la reforma desmantelaba la estructura pública sanitaria, en otras latitudes como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Israel y varios países europeos como Inglaterra, Suecia o regiones de ellos, el interés por la APS como centro del sistema sanitario cobraba mayor fuerza (Apraez, 2008).

Nuevamente, en septiembre de 2015 en la Asamblea General de la ONU, con la asistencia de 193 países y en virtud de la dificultad para el cumplimiento de las metas, se reevalúa la agenda hacia 2030 con el planteamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Cepal, ONU, 2016). Cabe destacar que Enfermería asiste a la Asamblea de la ONU como ONG por medio de dos de nuestras organizaciones: el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la Sociedad de Honor de Enfermería Sigma Theta Tau International, razón por la cual el compromiso como profesión con los postulados ha sido permanente y efectivo, no solo con aportes a sus propuestas y renovación, sino siendo pionera en los planteamientos, como en el caso del acceso universal a la salud; en su Código deontológico de 1953, el CIE insta a las enfermeras a defender “el acceso universal a la salud y a otros servicios sociales y económicos por motivos

de equidad y justicia social en relación con la asignación de recursos”.

También debemos reconocer las contribuciones de Enfermería desde la APS en todas las regiones del mundo y particularmente en Colombia, ya que existe amplia evidencia sobre la importancia que ha tenido nuestra profesión como recurso humano esencial en la disminución de las tasas de morbilidad y mortalidad materno-perinatal, aumento de la cobertura en la inmunización humana y efectividad en los resultados de atención en servicios de salud de baja, mediana y alta complejidad, entre otros.

Al tiempo, los problemas identificados en el sector salud colombiano desde la vigencia de la Ley 100 son varios, entre ellos la fragmentación y desintegración de la atención; la baja resolutivez; la alta carga de enfermedad; las fallas del mercado y los incentivos negativos entre los agentes y la falla regulatoria, lo que ha conllevado a aumentar la inequidad, la corrupción, el maltrato al usuario, el desorden administrativo, un modelo de prestación de servicios de salud morbo-céntrico y centrado en los actores, deshumanizado, descontextualizado y sin prevalencia de derechos (Moreno, 2016) además de la inequidad acumulada entre etnias, géneros, clases sociales y territorios, acompañada de la falta de reconocimiento de la diversidad (Agencia de Noticias UN, 2017).

Ahora bien: tres de los seis acuerdos de paz se refieren de manera explícita a la salud, lo que muestra la relevancia del sector para el mantenimiento de la paz. La agenda en materia de derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la salud, está dirigida a toda la población, la prioridad la constituyen la población rural, las víctimas del conflicto armado y los actores del conflicto (Urrego, 2016).

Los compromisos de salud se refieren a la oferta de servicios que acerquen a las comunidades y que respondan a los requerimientos diferenciales de las mujeres, las etnias y las regiones para prevenir que no se sigan perdiendo vidas y capacidades con enfermedades que son prevenibles; enfrentar los principales problemas de salud pública —como las diversas violencias y la desnutrición—; mejorar las

condiciones de vida de la población, que son las que determinan los procesos de salud y enfermedad, y fortalecer el sistema de protección y seguridad social para las personas de recursos limitados.

Además brindar atención integral psicosocial a las víctimas del conflicto y a los excombatientes y propiciar condiciones de trabajo digno y protegido por el derecho internacional humanitario.

Con el fin de impactar los procesos de determinación social de la salud en el campo colombiano es pertinente concebir políticas y programas en materia de tierras, producción, vivienda, educación, conectividad, sostenibilidad ambiental, seguridad/soberanía alimentaria y participación política, es decir todos estos aspectos contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para todo esto, desde la Enfermería colombiana (academia, asistencia e investigación) debemos prepararnos no solo cuantitativamente sino cualitativamente, pues el número de nuevos afiliados al sistema de salud se estima aproximadamente en 15 millones de personas entre campesinos, víctimas y excombatientes, es decir en cerca de un 75 % del territorio nacional (Urrego, 2016). En definitiva, es posible que se requiera de un replanteamiento del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), lo que exige que los programas de Enfermería de pregrado y posgrado de nuestro país piensen cómo aportar para enfrentar esta oportunidad y este nuevo reto sin precedentes e inaplazable de construir Nación.

REFERENCIAS

- Agencia de Noticias UN. (2017). Plan Nacional de Salud Rural, una oportunidad para construir paz. Recuperado de: <http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/articulo/plan-nacional-de-salud-rural-una-oportunidad-para-construir-paz.html>
- Apráz, N. G. (2010). Evaluación de la atención primaria de la salud en Colombia como política de salud 1939-2008. Tesis doctoral. Universidad Nacional de Colombia. Doctorado Interfacultades en Salud Pública.
- Cepal, Naciones Unidas. (2016). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Recuperado de: <http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf>
- Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. (Febrero de 2015). Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia.
- Magnussen, L., Ehiri, J. y Jolly, P. (Mayo-junio de 2004). Comprehensive versus selective primary health care: lessons for global health policy. *Health Aff (Millwood)*, 23(3), 167-176.
- Moreno, G. A. (Julio-diciembre de 2016). El nuevo Modelo de Atención Integral en Salud -MIAS- para Colombia. ¿La solución a los problemas del sistema? *Revista Médica Risaralda*, 22(2), 73-74.
- Urrego, J. H. (13 de agosto de 2016). La paz debe soportarse en un nuevo modelo de salud. *UN Periódico*. Recuperado de: <http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/articulo/la-paz-debe-soportarse-en-un-nuevo-modelo-de-salud.html>

CONFERENCISTAS INVITADOS

Rita Cecilia Plata de Silva

Decana Facultad de Enfermería
Universidad El Bosque

ISABEL CASABONA MARTÍNEZ

Doctora de la Universidad de Alicante, en la que se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias de la Salud. Magíster en Gestión y Dirección Estratégica de Hospitales. Enfermera y licenciada en Antropología Social y Cultural.

LUZ ANGÉLICA MUÑOZ GONZÁLEZ

Doctora en Enfermería, decana de la Universidad Andrés Bello (Chile), directora de la Maestría en Atención Primaria en Salud y coordinadora del Área de Enfermería del Proyecto Tuning para América Latina. Investigadora en Proyectos de Migraciones OPS/OMS.

MARÍA TERESA BUITRAGO ECHEVERRI

Doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Desarrollo Educativo y Social Cinde y Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Administración en Salud Ocupacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en Epidemiología de la Universidad de Antioquia y enfermera de la Universidad Nacional de Colombia.

OLGA OSORIO MURILLO

Doctora en Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Salud Pública de la Universidad del Valle y magíster en Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid (España). Ha sido docente de las universidades Santiago de Cali, del Valle, Libre Seccional Cali, de Antioquia y Javeriana de Cali. Enfermera de la Universidad de Caldas.

**BEATRIZ ELENA
ARIAS LÓPEZ**

Doctora en Salud Mental Comunitaria, magíster en Educación y Desarrollo Comunitario, enfermera, docente titular e investigadora adscrita al Departamento de Posgrados de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, miembro del Grupo de Investigación de Políticas Sociales y Servicios de Salud, líder de la línea de investigación “Salud mental, cuidado comunitario y ruralidad”.

**ANGÉLICA
FRANCO GAMBOA**

Doctora en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Antropología de la Universidad de los Andes, psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, pertenece al Grupo de Investigación Conflicto Social y Violencia del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente profesora asociada de la Universidad El Bosque.

Trabajos de investigación presentados

CATEGORÍA: CUIDADO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE UN ACCESO VENOSO PERIFÉRICO CORTO EN NIÑOS

Institución:

Pontificia Universidad Javeriana

Autores:

María Elizabeth Gómez Neva, Danuby Adriana Buitrago López y Martín Alonso Sepúlveda

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. En 2011, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) establece que el cambio del acceso venoso periférico en niños debe hacerse solo cuando esté clínicamente indicado, soportado por la falta de evidencia del riesgo de complicaciones. En el Hospital Universitario San Ignacio (HUSI), los accesos venosos periféricos cortos en niños se cambian con una frecuencia de 72 a 96 horas posterior a su inserción, basado en la evidencia de estudios en adultos. En la actualidad no se ha encontrado el beneficio de esta recomendación en la población pediátrica, por el contrario, existe mayor vulnerabilidad al riesgo y exposición al dolor.

Objetivo. Determinar el tiempo de permanencia del catéter venoso periférico corto en niños, con indicación médica de tratamiento endovenoso.

Materiales y métodos. Se diseñó un estudio observacional prospectivo, con seguimiento de tiempo hasta el evento. Se observaron los accesos venosos periféricos cortos de los pacientes pediátricos hospitalizados entre 0 y 15 años, con indicación médica de un acceso venoso periférico corto, desde el momento de la inserción del catéter hasta su retiro electivo o secundario a complicaciones como flebitis, extravasación u oclusión.

Resultados. La mediana de permanencia del acceso venoso periférico libre de complicaciones fue

de 129 horas. El análisis por subgrupos encontró que los tiempos de permanencia del catéter mostraron ser estadísticamente diferentes según el calibre del catéter de inserción y la categoría de edad.

Conclusiones. Los accesos venosos periféricos cortos en los niños mayores de un año de edad, podrían permanecer in situ cinco días (120 horas) libres de complicaciones.

Recomendaciones. Encaminar estudios de seguimiento observacional para determinar en otras instituciones el tiempo mediano de vida del catéter y el riesgo de su permanencia.

Agradecimientos. Pontificia Universidad Javeriana y Hospital Universitario San Ignacio.

SATISFACCIÓN USUARIA SEGÚN DETERMINANTES SOCIALES, EN CUIDADORES DE PACIENTES PEDIÁTRICOS

Institución:

Universidad de los Andes, Santiago Chile

Autores:

Carolina Rondón Sepúlveda

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. La satisfacción usuaria es uno de los principios orientadores de la Política Nacional de Salud. Sus acciones permiten cumplir los estándares de calidad, equidad y eficiencia.

Objetivo. Determinar la relación entre la satisfacción usuaria y los determinantes sociales de los cuidadores pediátricos.

Material y método. Diseño tipo correlacional en 304 cuidadores. Recolección a través de Picker's Pediatric Acute Care. Análisis de correlación con test de Pearson.

Resultados. La consistencia interna del instrumento fue de 0,82. Existe significancia entre el promedio de edad, la percepción de salud y los servicios de hospitalización. Los cuidadores perciben que

reciben menos información sobre el tratamiento y la enfermedad de sus hijos.

Conclusiones. Por cada aumento de un año en la edad del cuidador, la satisfacción usuaria aumenta en 5,35 puntos (IC95% 1,55 - 9,15 $p = 0,006$). Se valida la hipótesis de que los determinantes sociales influyen en la satisfacción usuaria.

sensibilidad, especificidad y ventajas, entre otros aspectos de las técnicas de recolección de muestras de orina.

Conclusión. El cateterismo vesical, a pesar de atravesar la uretra reduce el riesgo de contaminación de la muestra, brinda mejor sensibilidad y especificidad, y genera menos costos, se recomienda medir su implementación en la práctica.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE ORINA EN PEDIATRÍA. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Institución:

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

Autores:

Elizabeth Aguirre, Daniela Bermejo, Paola Guáqueta, Paula Montaña, Alexandra Castiblanco y Rodrigo Acero

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Las infecciones de vías urinarias (IVU) son frecuentes en la infancia y requieren de un rápido diagnóstico, mediante el uso de diferentes técnicas de recolección de muestra de orina, como bolsa adhesiva perineal, cateterismo vesical, punción suprapúbica o micción espontánea.

Objetivo. Identificar la técnica que reporta mayor efectividad, resultado preciso y comodidad en los servicios pediátricos, con base en la literatura disponible.

Materiales y métodos. Se realizó una revisión sistemática en las bases de datos Scielo, Medline, Cochrane, Elsevier, Pubmed y Google Académico. Después se seleccionaron títulos, resúmenes y textos completos, se evaluó la validez de los estudios y se clasificaron por niveles de evidencia y grados de recomendación con la propuesta de la CEBM. Se tuvieron en cuenta consideraciones de la Resolución 8430 de 1993 para estudios documentales.

Resultados. Se encontraron 3310 artículos, de los cuales 32 que cumplían con los criterios de selección. Los datos se organizaron según efectividad,

SIGNIFICADOS QUE HOMBRES ADOLESCENTES LE ATRIBUYEN A LA EXPERIENCIA DE EMBARAZAR Y SER PADRES

Institución:

Universidad Nacional Autónoma de México

Autores:

Estefany Berenice Manjarrez Hernández y José Salvador Sapién López

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Históricamente el embarazo ha sido un tema casi exclusivo de las mujeres, del que se excluye la participación de los hombres generando rechazo social y estigmatización, lo que se evidencia en su nula participación en la demografía porque son excluidos de las políticas públicas creadas en México. Esto repercute en su salud, familia y economía, ya que ellos son los principales representantes de los hogares.

Objetivo. Analizar los significados que hombres adolescentes le otorgaron a la experiencia de involucrarse en un embarazo y ser padres.

Metodología. Estudio cualitativo con perspectiva de género.

Participantes. Hombres de la CDMX y su periferia, implicados en un embarazo en su adolescencia. Muestreo mediante “bola de nieve”, historias de vida y entrevistas semiestructuradas, grabadas y transcritas. Se realizó un análisis categorial.

Resultados. Los hombres se consideraron exter-

nos al proceso de embarazo (T1), presentaron sentimientos encontrados al conocer a su hijo(a) (T2), frustración ante el rechazo de la familia de su cónyuge (T3), rechazo por diversos grupos sociales (T4), preocupación por el cumplimiento como proveedores (T5).

Conclusiones. Los hombres adolescentes asignan distintos significados al embarazo vivido, adoptan roles específicos en torno a su género de acuerdo con las construcciones socioculturales de la desigualdad sexual. La edad en que sucede el embarazo influye en su conducta, emociones y forma de vida.

Para el niño esta experiencia implicó situaciones y condiciones que generaron cuatro categorías: (1) sentimientos manifestados con frases como “Yo estaba muy nervioso cuando me dijeron que me iban a bañar, yo me estrese todo”, (2) comunicados del cuidado, (3) manifestaciones de cuidado y (4) satisfacción que evidencian con expresiones como “creo que las enfermeras me cuidaron bien, yo quisiera que ellas lo sepan y darles las gracias”.

Conclusiones. Estos hallazgos permitirán cambiar, mantener o reforzar estrategias de cuidado que disminuyan el efecto negativo que produce la hospitalización en UCIP.

EXPERIENCIA VIVIDA POR EL NIÑO HOSPITALIZADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EN RELACIÓN CON EL CUIDADO RECIBIDO

Institución:

Pontificia Universidad Javeriana

Autores:

Claudia Ariza, Rosalba Pardo y Herly Ruth Alvarado

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Según estudios realizados con adultos, la experiencia de hospitalización en la UCI genera diferentes sentimientos debido a los eventos traumáticos relacionados con la pérdida de la salud, el tratamiento recibido en la UCI y el ambiente particular del servicio. Poco se sabe del efecto en el paciente pediátrico, ya que generalmente se tienen en cuenta las necesidades percibidas por los cuidadores y no las del niño.

Metodología. Estudio de tipo fenomenológico hermenéutico que permite conocer la experiencia vivida y contada por el propio niño en relación con el cuidado durante su hospitalización en la UCIP. La muestra se saturó con 12 niños entre siete y diecisiete años, quienes realizaron un dibujo y relataron su significado.

MITOS SOBRE LA SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE LA COMUNA 4 DE VALLEDUPAR

Institución:

Universidad Popular del Cesar

Autores:

Angélica Isabel Romero Daza, Ada Luz Arenas Campo y Liliana Andrea Mosquera Mindiola

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Estudio que buscó determinar los mitos sobre la sexualidad en adolescentes de cuatro instituciones educativas oficiales pertenecientes a la Comuna 4 de Valledupar.

Metodología. Cualitativo descriptivo, con enfoque hermenéutico y etnográfico. Se entrevistaron 24 estudiantes hasta obtener la saturación de las categorías: (1) mitos relacionados con la sexualidad, (2) consecuencias de la práctica de mitos sexuales y (3) cátedra de educación sexual.

Resultados. Los adolescentes poseen falsas creencias a la hora de practicar su sexualidad, relacionados en especial con métodos anticonceptivos, sexualidad del hombre, mujer, pareja y masturbación; se evidencia fuerte arraigo cultural de tabúes que permanecen vigentes en la sociedad.

Algunos de los mitos destacados son: “con preservativo no se siente igual”, “una chica con la menstruación no puede quedar embarazada”, “orinar o tomar agua antes y después de tener relaciones evita el embarazo”, “la masturbación perturba la mente”, “si una persona con sida tiene relaciones con una virgen, se le quita”.

Conclusiones. Los mitos están presentes en la sexualidad de los adolescentes, factor que solo se le atribuye al factor reproductivo. Además los adolescentes autorreconocieron las consecuencias de ejercer su vida sexual en condiciones inseguras, guiadas por simples repeticiones populares y carentes de fundamento científico, a sabiendas del riesgo al que se encuentran expuestos. Por otra parte los adolescentes tienen una actitud vergonzosa a la hora de consultarles a los cuidadores principales sobre temas de sexualidad, por lo que acuden a fuentes como amigos e internet, que no siempre proporcionan información adecuada, lo que implica conductas amenazantes que podrían ser un factor que contribuya a los altos índices de embarazos no deseados en esta población.

se deben sustentar en la adquisición de competencias culturales para obtener resultados buenos y eficaces.

Objetivo. Comprender los saberes y prácticas para la prevención y el tratamiento de problemas respiratorios y gastrointestinales en niños guambianos menores de un año.

Metodología. Se realizó una etnografía focalizada utilizando entrevistas en profundidad. Participaron un médico tradicional, tres parteras (dos de ellas médicas tradicionales) y nueve madres de niños menores de un año con antecedentes de IRA y EDA.

Hallazgos. Emergieron siete dominios, entre ellos “el susto”, “manejo energético del niño” y el “poder curativo de las plantas”, los cuales mostraron que la cosmovisión de los participantes se orienta hacia la conservación de la armonía entre ellos y la madre naturaleza.

Conclusión. La cultura guambiana considera que la enfermedad se origina en una pérdida de la armonía de la persona con la naturaleza, con el espíritu y con su cuerpo. En consecuencia, los indígenas adoptan estilos de vida y costumbres en pro de la preservación de dicho equilibrio y en general del equilibrio entre el individuo y el ambiente que lo rodea.

PRÁCTICAS Y SABERES DEL CUIDADO DE LA SALUD EN NIÑOS INDÍGENAS: UNA PERSPECTIVA DESDE LA ETNIA GUAMBIANA

Institución:

Universidad del Valle

Autores:

Carmita Cepeda Chamorro, Vanesa Flórez Meza y Martha Lucía Vásquez Truissi

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. La cultura es imprescindible cuando se quieren abordar las prácticas y los saberes de una comunidad en torno a su perspectiva de salud y enfermedad para ofrecer un cuidado culturalmente congruente. Las acciones de la Enfermería

CAMBIOS EN LAS CONDICIONES, TRAYECTORIAS Y PROYECTOS DE VIDA DE LOS JÓVENES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO ASENTADOS EN BOGOTÁ

Institución:

Pontificia Universidad Javeriana

Autoras:

Sandra Mónica Rodríguez y Maribel Pinilla

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. La investigación busca visibilizar a los jóvenes en condición de desplazamiento, situa-

ción que normalmente es ignorada por parte de la sociedad y del Estado.

Metodología. Enfoque cualitativo con alcance descriptivo-analítico para analizar los cambios en las condiciones de vida, las trayectorias y los proyectos de vida de 35 jóvenes: 15 hombres y 20 mujeres en situación de desplazamiento forzado por la violencia, asentados en Bogotá.

Se realizó una aproximación a los cambios ocurridos en sus ámbitos individual, familiar y social, a través de sus trayectorias y proyectos de vida, comparando el antes y el después de la vivencia del desplazamiento. Para la recolección de los datos se realizaron cinco talleres participativos y diez entrevistas a profundidad, con una muestra de jóvenes sujetos voluntarios. Además se aplicaron dos entrevistas semiestructuradas a gerentes sociales de política pública de la ciudad: el de la “Política pública de salud para la población desplazada víctima del conflicto armado interno” y el de la “Política distrital para la atención a víctimas del desplazamiento forzado”, con el fin de contrastar las evidencias empíricas aportadas por los jóvenes, y las propuestas y acciones políticas para valorar el grado de congruencia entre estas políticas y las necesidades expresadas. A pesar de la vivencia del fenómeno del desplazamiento y de sus efectos en daños materiales, rupturas y pérdidas de familiares experimentados por los jóvenes asentados en la localidad de Ciudad Bolívar —que han modificado lamentablemente y en detrimento sus condiciones de vida, han vulnerado sus derechos, han afectado en su momento la trayectoria de sus vidas y han modificado su proyecto de vida—, los jóvenes muestran condiciones positivas en su proyecto de vida.

Resultados. La diferencia percibida por los jóvenes en cuanto al significado del desplazamiento, a esa postura juvenil cargada de optimismo, con potencialidades —por su carácter dinámico y su capacidad para afrontar las problemáticas debido a su manera de percibir las y enfrentarlas día a día— marca diferencias en sus necesidades particulares en relación con las de otros grupos poblacionales.

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA PARA ADOLESCENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD

Instituciones:

Universidad del Tolima y Universidad Nacional de Colombia

Autoras:

Claudia Patricia Bonilla Ibáñez y Luz Patricia Díaz Heredia

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. En la actualidad el sobrepeso y la obesidad en la población adolescente son unos de los mayores problemas de salud pública pues sus incidencias van en aumento, lo que genera de manera prioritaria visibilizar las intervenciones para la prevención y el manejo en la casa, la escuela y la familia.

Objetivo. Identificar las características de las intervenciones desarrolladas por profesionales de la salud en diferentes disciplinas y enfermería en cuanto a nutrición y actividad física para la prevención de sobrepeso y obesidad en el adolescente.

Metodología. Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos Pubmed, Scielo, Science Direct y Ovid de estudios cualitativos y cuantitativos —incluyendo revisiones sistemáticas y metaanálisis— publicados en el periodo 2005-2015. La calidad metodológica se evaluó teniendo en cuenta los criterios del CASPe, Strobe y Prisma.

Resultados. Se recogió información de 47 estudios desarrollados por enfermeras o por grupos interdisciplinarios en los que la participación de la enfermera fue evidente; se realizaron intervenciones en temas de nutrición y actividad física.

Conclusiones. Existe diversidad en las intervenciones en cuanto a teorías utilizadas, dosis, intensidad, respuesta y seguimiento, lo que implica que no existe una intervención en Enfermería claramente definida y que sea el estándar para enfrentar este problema de salud.

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA A GESTANTE ADOLESCENTE CON DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL PROCESO DE MATERNIDAD

Institución:

Universidad Simón Bolívar

Autoras:

Jessica Paola Martínez Escamilla y María José Ghisays López

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. El estudio de caso es una herramienta en la que se le permite al enfermero –por medio de la investigación– estudiar y explorar el estado de salud-enfermedad del paciente, la familia o la comunidad, ya que estos juzgan y revisan las necesidades que se padecen en su ambiente.

Metodología. Estudio cualitativo de tipo descriptivo, en el cual se narra y describe el proceso de selección del paciente. Se identificaron los dominios alterados mediante la valoración por dominios, y además se llevó a cabo el examen físico empleando los instrumentos familiares Familiograma, Ecomapa, Apgar y el Test de adherencia al tratamiento.

Resultados. Se identificó que la paciente estaba en el ciclo vital de la adolescencia, en una familia en extensión completa, y al valorar las necesidades se encontró que aunque presentaba dificultades en el proceso de maternidad debido a su edad, estaba dispuesta a mejorar dicho proceso. Se aplicó el plan de atención de enfermería realizado según las taxonomías Nanda, NOC y NIC, además del Modelo de sistemas de Betty Neuman para fomentar las conductas saludables en la paciente.

Conclusión. El embarazo en adolescentes es una problemática creciente que se debe abordar multidisciplinariamente y tratarse como una prioridad.

CRITERIOS PARA EVALUAR LA EVITABILIDAD DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS EN PEDIATRÍA. UNA REVISIÓN INTEGRADORA DE LA LITERATURA

Institución:

Universidad del Norte

Autores:

Roxana de las Salas, Kevin Orta Visbal, Dolores Vanessa Serrano, Fabián Torres Moreno y Carolina Figueroa

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. Aunque las reacciones adversas a medicamentos (RAM) son comunes en pediatría, las herramientas disponibles para su evaluación son escasas.

Objetivo. Identificar criterios para evaluar la evitabilidad de las RAM en pediatría.

Materiales y métodos. Se realizó una revisión integradora de la literatura en Medline (Ovid platform, In-Process, Daily Update), Embase, Lilacs. Se usaron los términos MESH, siguiendo la estrategia de búsqueda con las palabras Tool OR Algorithms OR Guideline OR Criteria OR List OR Screening tool OR Software OR Statement OR Consensus AND Avoidability OR Preventability.

Resultados. Se encontraron 18 títulos, de los cuales ocho cumplieron los criterios de inclusión, y solo una herramienta diseñada para evaluar evitabilidad. Después de analizar cada uno de los elementos incluidos en cada herramienta, se establecieron tres categorías: (1) Definitivamente prevenible/evitable, (2) Probablemente prevenible y (3) No prevenible/evitable. La propuesta planteada es dicotómica y será sometida a fases posteriores para establecer la validez facial y de contenido.

Conclusiones. La propuesta acoge elementos importantes en la prescripción y administración de medicamentos. Los criterios identificados son un aporte a la seguridad del paciente y a las herramientas de análisis y gestión del riesgo asociado con el uso de medicamentos en un grupo poblacional vulnerable.

ESTILOS DE VIDA RELACIONADOS CON FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Institución:

Universidad Metropolitana

Autoras:

Rosa Morales Aguilar, Alba Pardo Vázquez y Damar Barraza Ospino

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. Los estilos o hábitos de vida son un conjunto de comportamientos que desarrollan las personas, algunos de los cuales son saludables y otros son nocivos para la salud. Comportamientos como inactividad física, alimentación no saludable y consumo de sustancias psicoactivas –como el cigarrillo y el alcohol– constituyen los principales factores de riesgo para adquirir enfermedades crónicas no transmisibles. La adolescencia es una etapa de transición que culmina en la adultez; es una fase en la que se elabora la identidad definitiva que determinará la personalidad adulta del individuo. El comportamiento adolescente es variable e influenciado por el entorno, lo cual repercute en su estilo de vida. Las enfermedades cardiovasculares –primera causa de mortalidad entre 2005 y 2013– y sus manifestaciones clínicas se presentan típicamente en la edad adulta, aunque sus factores de riesgo modificables están determinados en gran medida por los comportamientos aprendidos en la niñez y que continúan en la edad adulta. Por ser estas uno de los objetivos de salud pública mundial y nacional, la presente investigación analiza el comportamiento de los estilos de vida de los estudiantes, relacionados con factores de riesgo cardiovascular, como un aporte a la prevención de las futuras generaciones.

Objetivos. Identificar los estilos de vida de los estudiantes, relacionados con factores de riesgo cardiovascular como sobrepeso, inactividad física, mala alimentación y consumo de tabaco y alcohol.

Metodología. Estudio descriptivo-transversal cuya población son 296 adolescentes de entre 13 y 17 años de un colegio del Distrito de Barranquilla. Para seleccionar la muestra se utilizó el tipo aleatorio simple. El instrumento empleado fue la Encuesta Mundial de Salud Escolar, que evalúa factores de riesgo cardiovascular como mala alimentación, inactividad física y consumo de tabaco y alcohol.

Resultados. Se fundamentaron las bases para diseñar programas de promoción y prevención en las instituciones educativas que contribuyan a cambiar conductas y establecer estilos de vida saludables tendientes a minimizar la aparición de enfermedades crónicas.

CATEGORÍA: ÉTICA Y BIOÉTICA

TENSIONES BIOÉTICAS Y PRINCIPIOS APLICABLES EN MISIÓN MÉDICA: ¿EXISTEN LÍMITES AL CUMPLIMIENTO DEL DEBER?

Institución:

Universidad El Bosque

Autora:

Gloria Omaira Bautista Espinel

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. La investigación analiza la Misión Médica (MM), en especial los principios que esta involucra. En este proceso se parte de la revisión de las diversas categorías de principios que existen. La perspectiva que se asume busca ir más allá del mecanismo jurídico.

Objetivo. Identificar los principios bioéticos aplicables a las tensiones que emergen en la MM en zonas de conflicto armado y las limitaciones que existen en el cumplimiento del deber. Los problemas que enfrenta la MM son relativos a la exigibilidad de los derechos humanos y se relacionan con los principios ejercidos en el marco de valores como protección a la vida, dignidad humana, neutralidad y vulnerabilidad. Las tensiones que emergen no obedecen a un análisis elaborado por el agente de salud, pero sí comprometen su capacidad de decisión. En este contexto, la bioética tiene grandes desafíos que trascienden la bioética clínica y amplían de forma importante su campo de intervención porque implica un análisis crítico sobre la dimensión del conflicto, desde diferentes perspectivas, para sentar las bases de un posterior consenso durante el posconflicto que modifique la concepción del otro y contribuya a la reconstrucción posbélica.

CATEGORÍA: CUIDADO DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD CRÓNICA

USO DE LAS TIC PARA PROMOVER LA AUTOGESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PIE DIABÉTICO

Institución:

Universidad de La Sabana

Autoras:

Ana María Murillo Salamanca y Alejandra María Alvarado García

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Las enfermedades crónicas no transmisibles, entre las cuales la diabetes mellitus tipo 2 (DMt2) es una de las más representativas, son la principal causa de muerte e incapacidad en el mundo, en especial en países en vías de desarrollo como Colombia. La presencia de alteraciones microvasculares y macrovasculares asociadas con la ausencia de hábitos de vida protectores —que fomenten la autogestión para la prevención de complicaciones— predispone a la aparición del pie diabético

Objetivo. Desarrollar una intervención de Enfermería para promover la autogestión en personas con diabetes mellitus tipo 2, para la prevención de úlceras por pie diabético usando las TIC.

Metodología. Se realizó la intervención de Enfermería enmarcada en los conceptos de la teoría de mediano rango de adaptación a las condiciones de salud crónicas, en tres fases que permitan alcanzar la autogestión de los adultos con DMt2 para alcanzar la autogestión como proceso adaptativo y que permitan prevenir las úlceras por pie diabético utilizando las TIC. Se desarrollará un estudio cuasi experimental pretest y postest en adultos en una institución de Boyacá.

Resultados. En curso.

EVIDENCIAS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA VERSIÓN COLOMBIANA DEL CUESTIONARIO DISABKIDS PARA MEDIR CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON ENFERMEDAD CRÓNICA. VERSIÓN NIÑOS

Institución:

Universidad Manuela Beltrán

Autora:

Nadia Carolina Reina Gamba

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Aportar evidencias de validez y confiabilidad de la versión colombiana del cuestionario Disabkids en su Versión Niños para medir la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en niños y adolescentes con enfermedad crónica.

Materiales y métodos. Diseño instrumental. Validación psicométrica del cuestionario Disabkids-37 estableciendo fiabilidad, validez de constructo, discriminante y convergente, y grado de concordancia entre la versión niños y padres. Los participantes fueron 252 niños y adolescentes con edades entre los 8 y 18 años.

Resultados. La fiabilidad mostró un coeficiente del alfa de Cronbach buena de 0,88. Las evidencias de validez interna mostraron eficacia del constructo a través del análisis factorial exploratorio de cinco factores que coincidieron casi por completo con cuatro de las seis dimensiones del cuestionario original fusionadas, con una varianza explicada del 44,24% y cargas factoriales $> 0,3$. El análisis factorial confirmatorio mostró que los datos se ajustan al modelo del Disabkids de una manera satisfactoria, con $RMSEA = 0,067$, $CFI = 1$.

Las evidencias de validez externa mostraron diferencias por sexo, edad, estrato socioeconómico, tipo de enfermedad y presencia de hermanos; la validez convergente con el Kidscreen-52 mostró buena correlación $r = 0,66$. La concordancia entre la versión niños y la versión padres fue baja $ICC = 0,38$.

INCERTIDUMBRE EN TRAUMA RAQUIMEDULAR A PARTIR DE LA TEORÍA MERLE MISHEL

Institución:

Universidad del Valle

Autoras:

Luz Helena Sánchez Nieto y Consuelo Burbano López

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Determinar el nivel de incertidumbre de las personas con trauma raquimedular a partir de la Teoría de Merle Mishel y su asociación con las características sociodemográficas.

Materiales y métodos. Estudio descriptivo, transversal. Se aplicó la teoría de la incertidumbre frente a la enfermedad de Merle Mishel en 107 personas con trauma raquimedular.

Resultados. De la muestra estudiada, el 96% fueron hombres y el 4% mujeres, con un promedio de 36 años de edad, un mínimo de 19 y un máximo de 59 años; el tiempo promedio de lesión fue de 151 meses. Se encontró asociación significativa del nivel de incertidumbre con el estado civil, el bajo nivel educativo, el régimen de seguridad social en salud y la baja capacidad cognitiva.

Resultados. Se evidenció que las personas con este tipo de lesión abandonan su proceso de rehabilitación por deficiencias en el sistema de salud, lo que ocasiona un retraso en la adaptación a su nueva situación de vida.

Conclusión. La incertidumbre que genera el trauma raquimedular en las personas sigue siendo un problema de salud pública en Colombia y el mundo, ya que los altos índices de violencia en el país ocasionan mayor condición de discapacidad en personas jóvenes generando altos costos en la atención de salud y afectando el equilibrio familiar, económico y social de las personas que lo sufren. Así mismo constituye un desafío para el cuidado de Enfermería.

LA PRÁCTICA CLÍNICA: UN ESCENARIO PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CUIDADO DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD CRÓNICA

Institución:

Universidad de Antioquia

Autora:

Martha Cecilia Torres Panesso

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Interpretar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación del estudiante de Enfermería, durante la práctica clínica, para el cuidado del paciente con enfermedad crónica.

Materiales y métodos. Investigación cualitativa, enfoque hermenéutico, etnografía focalizada. Selección de la muestra por conveniencia, con recolección de la información mediante técnicas de observación no participante en práctica clínica y entrevista semiestructurada a ocho estudiantes de Enfermería de séptimo semestre, cuatro profesores de teoría y práctica clínica, salvaguardando los criterios éticos de autonomía y anonimato. Método de análisis etnográfico propuesto por Hammersley y Atkinson, sustentado en los referentes teóricos de Enfermería de Benner y José Luis Medina en el currículo de Enfermería.

Resultados. Enseñanza-aprendizaje del cuidado al paciente con enfermedad crónica durante la práctica clínica centrado en la enfermedad, influenciado por el modelo biomédico. Rol de la enfermera alejado de las necesidades de la persona ante las respuestas humanas frente a la pérdida de la salud.

Conclusiones. Se evidenciaron divergencias entre los saberes enseñados en la teoría y la práctica para el cuidado del paciente con enfermedad crónica, los cuales distan del rol de ayuda y recuperación de la independencia del paciente y la familia en el proceso de afrontamiento de la enfermedad y recuperación durante la hospitalización.

SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA DE RIESGO INTERMEDIO Y ALTO, EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL EN EL PERIODO 2008-2014

Instituciones:

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y
Universidad El Bosque

Autor:

Nelson Rolando Campos Guzmán

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Para el periodo 2000-2006 el cáncer de próstata en Colombia registró 14 903 muertes, con una tasa ajustada por edad de 11,9/100 000 hombres, una incidencia de 7957 casos/año.

Objetivo. Estimar la supervivencia de los pacientes del régimen especial diagnosticados con cáncer de próstata de riesgo intermedio y alto.

Metodología. Estudio de supervivencia longitudinal retrospectivo que estima la función de supervivencia y los criterios de inclusión de pacientes diagnosticados por médico especialista. Los criterios de exclusión fueron pacientes tratados para cáncer de próstata en otra institución, tumores primarios diferentes a próstata y quienes consultaron para tomar una segunda opinión médica.

Conclusiones. La supervivencia global de los pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio y alto fue del 57% a cinco años y del 55% a siete años; el mayor número de fallecimientos ocurre en los tres primeros años posteriores al manejo por hemato-oncología.

Se observaron cambios drásticos en el curso de la historia natural de la enfermedad de los pacientes que se clasifican en alto riesgo; en este caso la supervivencia se modifica al 35% a cinco años y a solo un 30% a siete años.

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE CALIDAD DE VIDA DE BETTY FERRELL, PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD CRÓNICA

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Autoras:

Lina Rocío Corredor Parra y Gloria Mabel Carrillo

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. La calidad de vida de las personas con enfermedad crónica es un fenómeno de interés que se debe explorar desde diferentes perspectivas, por parte tanto de los profesionales como de los usuarios. Los instrumentos utilizados para evaluar la calidad de vida son herramientas útiles que deben suministrar información real, segura y adecuada para promover programas, diagnosticar situaciones y evaluar tratamientos, entre otros aspectos. Por ello deben seguir procesos psicométricos de validez y confiabilidad que permitan su uso en el contexto nacional y latinoamericano.

Objetivo. Determinar la validez y confiabilidad del instrumento de calidad de vida de Betty Ferrell para personas con enfermedad crónica, en el contexto colombiano.

Método. Estudio de abordaje cuantitativo-descriptivo de corte transversal metodológico en el que participaron 287 personas con enfermedad crónica no transmisible. Se validaron tanto el contenido —por medio de los índices de concordancia de Kappa y el de validez de contenido (IVC)— como el constructo y la confiabilidad por consistencia interna mediante el alfa de Cronbach.

Resultados. Se determinó una validez de contenido adecuada con un IVC de 0,9, y un índice de Kappa de 0,61; la consistencia interna por medio de alfa de Cronbach fue de 0,88. Respecto a la validez de constructo, el análisis de carga factorial de los ítems en los cuatro factores extraídos y al intentar establecer una relación con la estructuración de las dimensiones planteada por el autor, no se encon-

tró una coincidencia total entre estos dos aspectos. Solo 22 de los 41 ítems son explicados por el factor subyacente a la dimensión planteada por el autor, observándose marcada discrepancia en las dimensiones de bienestar psicológico y social.

Conclusiones. El instrumento de calidad de vida de Betty Ferrell tiene una alta comprensibilidad. Se requiere seguir estudiando validez de constructo para su uso en el contexto local.

IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO A PACIENTE ONCOLÓGICO QUE RECIBE QUIMIOTERAPIA POR PRIMERA VEZ, CON EL FIN DE MODULAR SU NIVEL DE INCERTIDUMBRE

Institución:

Fundación Universitaria Sanitas

Autores:

Jeimmy Lorena Moreno Rodríguez y Germán Andrey Sarmiento Velasco

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. El cáncer es una enfermedad reconocida en todo el mundo por sus altas tasas de mortalidad, pues se calcula que de alrededor de 14,7 millones de casos nuevos, hay ocho millones de muertes a causa del cáncer. Así mismo se observa que esta enfermedad genera diversos sentimientos en los pacientes, como la incertidumbre.

Objetivo. Implementar un protocolo de seguimiento de pacientes oncológicos ambulatorios que inician tratamiento de quimioterapia por primera vez en una unidad médica de oncología de Bogotá.

Metodología. Se utilizó el marco lógico, que permitió evaluar el proyecto en todos sus momentos, y así mismo se realizó un análisis pre y post a la implementación del protocolo a cada uno de los pacientes que recibían tratamiento con quimioterapia por primera vez, utilizando una escala empírica ba-

sada en los conceptos de la teoría de Merle Mishel. *Resultados.* Se logra evidenciar que la escala utilizada basada en los conceptos de Merle Mishel refiere tener una disminución en el nivel de incertidumbre en el paciente oncológico.

Conclusiones. La intervención por parte del personal de Enfermería es de vital importancia para nivelar la incertidumbre en estos pacientes.

PERCEPCIÓN PSICOSOCIAL DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN UNA INSTITUCIÓN DE SALUD DE BARRANQUILLA

Institución:

Universidad Simón Bolívar

Autoras:

Gladys Gaviria García, Gloria Lastre Amell y Mariela Suarez Villa

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. La enfermedad renal crónica se considera como un problema de salud pública debido a que su impacto sanitario, económico y social afecta la calidad de vida del individuo.

Objetivo. Describir la percepción psicosocial del paciente con enfermedad renal crónica en una unidad de hemodiálisis de Barranquilla.

Materiales y métodos. Estudio cualitativo en el que se interrogó a 13 pacientes mediante una entrevista semiestructurada con siete preguntas relacionadas con la percepción psicosocial que aborda el paciente hemodializado. Los pacientes se seleccionaron por muestreo no probabilístico según criterios de inclusión y exclusión, conservando los aspectos éticos y metodológicos correspondientes.

Resultados. El estudio reveló que los pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a hemodiálisis en la institución objeto de estudio no ven afectadas sus actividades cotidianas y no presentan limitaciones físicas ni sociales. El soporte es-

piritual, los grupos de apoyo social, el personal de Enfermería, la familia y los amigos y vecinos juegan un papel fundamental para incluirse en sus actividades diarias. El 100% manifestó satisfacción con la atención prestada.

Conclusión. La atención brindada por Enfermería, con un abordaje integral a los pacientes hemodializados, muestra una diferencia significativa en la aceptación y adherencia al tratamiento dialítico. El apoyo espiritual, familiar y social juega un rol importante en la vida del paciente.

VIVIR CON UNA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

Institución:

Universidad del Valle

Autora:

Claudia Liliana Valencia Rico

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Conocer el significado de las experiencias vividas por personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Metodología. Estudio con enfoque cualitativo de tipo fenomenológico hermenéutico de Heidegger. Se realizaron entrevistas en profundidad a 10 personas que presentaban enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave y muy grave.

Resultados. La información recolectada muestra las experiencias manifestadas por las personas en su cotidiano vivir, con lo que se identifican dos temas comunes: el proceso de la enfermedad, y el permanente camino hacia la pérdida de roles, con nueve subtemas descritos que permiten interpretar que para una persona con esta enfermedad estar en el mundo significa padecer un estado prolongado de síntomas desagradables que generan una dolorosa pérdida de roles.

Conclusión. Los hallazgos revelados en las historias de vida de los pacientes muestran un común

denominador en los significados, relacionados con el proceso de la enfermedad, cuyo fenómeno de origen se relaciona con la experiencia de los síntomas y las consecuencias que desencadenan en su forma de vida. En cuanto a la pérdida de roles, los significados son otorgados según la idiosincrasia cultural adoptada por hombres y mujeres, los patrones de conducta y las expresiones propias de cada rol.

INSTRUMENTO COMPETENCIA PARA EL CUIDADO (CUIDAR) EN EL HOGAR: DISEÑO Y VALIDACIÓN

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Autoras:

Gloria Mabel Carrillo, Beatriz Sánchez Herrera y Elizabeth Vargas Rosero

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Se requiere contar con escalas que midan la competencia para el cuidado en el hogar de pacientes con enfermedades crónicas, por cuanto estos reciben excesivos lineamientos para su cuidado y se enfrentan a terapéuticas en extremo complejas.

Objetivo. Desarrollar y realizar pruebas psicométricas del instrumento “Cuidar” versión abreviada para valorar la competencia para el cuidado en el hogar de una persona con enfermedad crónica.

Método. Estudio transversal de validación de instrumento en el que a partir de la versión original de la escala “Cuidar” se desarrolló su versión abreviada; se realizaron pruebas de validez facial y de contenido por medio de panel de expertos; validez de constructo con análisis factorial exploratorio, y pruebas de confiabilidad mediante análisis de consistencia interna con el alfa de Cronbach.

Resultados. El instrumento “Cuidar” —que mide la competencia de una persona con enfermedad

crónica para el cuidado en el hogar— en su versión abreviada consta de 20 ítems que incluyen seis dimensiones: (1) el conocimiento, (2) la unicidad o las condiciones personales para el cuidado, (3) la instrumental o procedimental, (4) el disfrute o condiciones mínimas de bienestar, (5) la anticipación o capacidad de prever e identificar situaciones de alarma y (6) la relación e interacción social o red de apoyo con que cuenta el paciente. Su estratificación tiene niveles bajo, medio y alto. La validez con expertos evidenció claridad, coherencia, suficiencia y relevancia de la escala.

El análisis factorial ratificó sus seis componentes mediante la rotación Varimax con asociación de los ítems en las mismas categorías propuestas en la versión original. El alfa de Cronbach fue de 0,928.

Conclusiones. El Instrumento “Cuidar” versión abreviada evalúa integralmente la competencia para el cuidado en el hogar de una persona con enfermedad crónica; así mismo demostró validez de contenido, de constructo y alta consistencia interna para su uso en el contexto colombiano.

APLICACIÓN TELEFÓNICA PARA PROMOVER LA ADHERENCIA AL AUTOCATETERISMO VESICAL INTERMITENTE EN PERSONAS CON VEJIGA NEUROGÉNICA

Institución:

Universidad de La Sabana

Autores:

Jeissy Adriana Beltrán Caicedo, María Elisa Moreno Fergusson y Óscar Boude Figueredo

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Desarrollar la herramienta para una intervención de Enfermería encaminada a promover la adherencia al autocateterismo intermitente en personas con vejiga neurogénica, basado en la teoría de adaptación a las enfermedades crónicas.

Metodología. El estudio involucra dos fases: (1) diseño del contenido, basado en la revisión de la literatura, el cual se sometió a una prueba de comprensibilidad en la que participaron seis profesionales de la salud y cinco personas con lesión medular; (2) uso de la herramienta JQuery Mobile para construir la App y prueba piloto, previo consentimiento informado del participante.

Resultados. La App para dispositivos móviles tipo Android contiene información sobre el funcionamiento vesical, el tratamiento y las complicaciones de la vejiga neurogénica; control de eliminación urinaria; registro de pruebas diagnósticas; chat y calendario. Con base en los resultados de la prueba piloto se realizaron los ajustes correspondientes.

Conclusiones. La App constituye una herramienta de apoyo apropiada para promover la adherencia al autocateterismo intermitente, porque le facilita al paciente asumir el automanejo de su condición e interactuar con profesionales en tiempo real. Además, el acceso a la plataforma favorece el seguimiento al proceso de adherencia y permite medir el efecto de la intervención, por tener acceso a los registros.

las. Por medio del uso de estas herramientas tecnológicas informativas se busca que el paciente, el cuidador y el equipo de salud se empoderen del cuidado y el manejo de las lesiones de piel.

Objetivo. Poner en marcha un weblog para la prevención, el tratamiento y el control del cuidado básico y avanzado de personas con lesiones de piel, brindando información basada en la mejor evidencia científica actualizada disponible.

Resultados. Implementación del weblog “Pielarte UN” como una herramienta informativa de cuidados, creado en la plataforma Wordpress, haciendo pertinente la divulgación de esta herramienta en distintos eventos académicos.

Conclusiones. Las TIC constituyen una estrategia para las intervenciones de la Enfermería en materia de información a pacientes, cuidadores y profesionales para prevenir lesiones de piel relacionadas con el cuidado y la dependencia. El uso de las TIC le permite a la Enfermería empoderarse del cuidado de las lesiones de piel y del uso y la implementación de las tecnologías de la comunicación.

UNA WEBLOG PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Autoras:

Renata Virginia González, Catalina Cruz y Alejandra Chauta

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Las TIC son un fenómeno cuyo uso ha permitido desarrollar el aprendizaje y el conocimiento de la salud. Gracias a su implementación, la Enfermería ha hecho viable acciones para el tratamiento, la promoción y la prevención de las lesiones de piel relacionadas con la dependencia funcional u otros factores de riesgo para padecer-

MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES EN CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS CON ARTRITIS REUMATOIDE

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Autoras:

Olga Janneth Gómez

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Método. Por medio de un estudio cuantitativo-predictivo se estableció un modelo de ecuaciones estructurales para determinar la relación entre las características de la calidad de vida, el nivel de salud y los factores sociodemográficos y de acceso a la seguridad social en una muestra de 635 personas con artritis reumatoide (AR).

Resultados. Se encontró una correlación positiva moderada de 0,596 estadísticamente significativa $P = <0,001$ entre la calidad de vida y el nivel de salud. Los factores sociodemográficos que predicen una peor percepción de calidad de vida y nivel de salud de los participantes son la característica “ser mujer”, que reducen el nivel promedio de calidad de vida (valor Beta -4,116 puntos $P = <0,001$) y el nivel de salud (Beta -19,83 puntos $P = <0,001$) con respecto a ser hombre. Así mismo, pertenecer al grupo de primaria o primaria incompleta (Beta -4,38 $P = <0,000$) reduce el nivel promedio de calidad de vida con respecto al grupo que refiere un mayor nivel educativo. El estrato socioeconómico 2 o menos se asocia con una peor calidad de vida y un nivel bajo de salud (Beta -9,288 $P = <0,000$) con respecto a pertenecer a un estrato socioeconómico más alto.

Pamela Reed. De acuerdo con sus prácticas, los cuidadores comparten sus asuntos espirituales, problemas y alegrías con familiares, realizan lecturas espirituales, meditación y oración; sus creencias apuntan al acercamiento constante con Dios, o un ser supremo, y consideraran el perdón como parte importante en sus vidas porque fortalece la espiritualidad y ayuda a tomar decisiones.

Conclusión. Un nivel alto de espiritualidad en cuidadores principales de niños con cáncer les permite afrontar —sobre todo a la madre— el sufrimiento, las angustias, la ansiedad y el desconsuelo cuando el deterioro del menor es evidente a pesar del tratamiento médico y el cuidado de un equipo interdisciplinario. Llevar a cabo prácticas y creencias espirituales media en la recuperación de la salud y mejora la calidad de vida del menor y de su familia.

ESPIRITUALIDAD EN CUIDADORES FAMILIARES DE NIÑOS CON CÁNCER EN CARTAGENA DE INDIAS

Institución:

Universidad de Cartagena

Autoras:

Isabel Patricia Gómez Palencia, Jennifer Arteaga Álvarez, Kelly Tatiana González Cortez, Erlis Julieth Nisperuza Luna y Didier Yomalis Reales Palencia

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Describir la espiritualidad en los cuidadores familiares de niños con cáncer.

Método. Estudio descriptivo transversal. La población fueron 111 cuidadores familiares de niños con cáncer. Se emplearon los instrumentos “características sociodemográficas” y “escala de perspectiva espiritual de Pamela Reed”.

Resultados. Se encontró un nivel de espiritualidad de 53,7/60 de los cuidadores principales de niños con cáncer, según la escala de espiritualidad de

PROCESO DE ADAPTACIÓN DE UN GRUPO DE PACIENTES ADULTOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN LA CONSULTA DE ENFERMERÍA EN REHABILITACIÓN

Institución:

Clínica Universidad de La Sabana

Autores:

Oswaldo Crespo Rodríguez, Jeissy Beltrán Caicedo y María Elisa Moreno Ferguson

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Describir los resultados del cuidado de Enfermería enfocado en la autogestión para la adaptación de los pacientes atendidos en la consulta de enfermería en rehabilitación.

Método. Estudio retrospectivo del perfil de Enfermería de 376 pacientes adultos, atendidos en el periodo 2013-2016. Este valora la adherencia al tratamiento farmacológico y las cinco necesidades básicas del modo fisiológico del Modelo de Roy, con una escala Likert de 1 a 5. El análisis descrip-

tivo de los datos se realizó con el SPSS® Versión 22. El estudio fue avalado por el Comité de Ética Institucional.

Resultados. El promedio de edad de los pacientes fue 52 años. Los diagnósticos más frecuentes fueron: riesgo de caídas, alteración en la integridad de la piel, estreñimiento, déficit en el autocuidado y alteración en los requerimientos nutricionales. Los resultados obtenidos con la intervención fueron en promedio: oxigenación (4,97), nutrición (4,83), eliminación intestinal (4,84), eliminación urinaria (4,79), patrón de sueño (4,93), riesgo de caídas (316) y adherencia al tratamiento farmacológico (4,70).

Conclusiones. El Modelo de Roy es un referente teórico útil para orientar el cuidado de Enfermería. Los resultados del estudio muestran que todos los pacientes atendidos mejoraron los indicadores en las necesidades evaluadas al concluir el proceso de rehabilitación.

Métodos. Estudio observacional con fotografías seleccionadas al azar entre las registradas en el ensayo clínico Penfup; tres expertos las evaluaron de forma encubierta. Se valoraron los REHCE para identificar los registros de UPP. Para cada evaluación se calculó el índice Kappa y la proporción de acuerdo compuesto.

Resultados. Se incluyeron 225 fotografías (184 pacientes) 97 con UPP y 128 sin lesión. Hubo una concordancia buena entre los expertos en la presencia de UPP y entre buena y moderada para el grado. Al evaluar la concordancia entre los REHCE de UPP y la evaluación de los expertos en las mismas áreas, se observó una concordancia buena para la presencia de UPP, y moderada para los grados.

Conclusiones. La fotografía digital de las UPP permitió una evaluación concordante entre evaluadores. Esta herramienta proporciona mayor precisión en el diagnóstico de las UPP.

EVALUACIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN POR MEDIO DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS. UN APORTE A LA EVIDENCIA

Institución:

Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología

Autoras:

Olga Cortés, Paula Alvarado, Yudy Rojas y Paula Pinzón

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. La fotografía digital en la evaluación de las úlceras por presión (UPP) es una tecnología que contribuye a mejorar la calidad del cuidado de los pacientes hospitalizados.

Objetivos. Evaluar la concordancia interobservador en la identificación y el grado de la lesión entre expertos en UPP y entre expertos y los registros de Enfermería en la historia clínica electrónica (REHCE) utilizando registros fotográficos.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL MENOR DE EDAD CON HEMOFILIA

Institución:

Fundación Universitaria Sanitas

Autoras:

Paola Andrea Ruge Prieto, Yulieth Katherin Tinoco Ordoñez y Yesika Lizeth Usaquén Lagos

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. La hemofilia es una enfermedad huérfana genética recesiva que impide la correcta coagulación de la sangre. Según la Federación Mundial de Hemofilia (FMH), en los últimos años se ha evidenciado un importante incremento mundial en el número de casos de hemofilia. Esta patología se acompaña de múltiples complicaciones biológicas, psicológicas y sociales que afectan en especial a los menores de edad y a sus cuidadores. Además se evidenció un vacío en el conocimiento de la Enfermería relacionado con esta patología.

Objetivo. Proponer un plan de cuidado que oriente la atención que el profesional de Enfermería debe ofrecer al menor de edad que padece de hemofilia.

Metodología. Revisión de la literatura: se consultaron bases de datos, revistas especializadas impresas o digitales, y fuentes de búsqueda no formal.

Resultados. Se encontró que las principales complicaciones en el menor con hemofilia son hematológicas y osteomusculares, las que también afectan las esferas biológica, psicológica y social. Se presenta una serie de diagnósticos e intervenciones para el abordaje de las complicaciones según la complicación afectada del menor de edad y su familia.

Conclusiones. La principal intervención costo-efectiva de la Enfermería es la educación continua y la utilización del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Objetivo. Identificar las competencias de los cuidadores de personas con enfermedad crónica en una institución prestadora de servicios de salud en San José de Cúcuta.

Materiales y métodos. Estudio cuantitativo y descriptivo. La muestra la conformaron 360 cuidadores, a quienes les fueron aplicados los instrumentos GCPC-UN-C© y “Cuidar” (versión corta) del Grupo de Cuidado al Paciente Crónico, de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia.

Resultados. Se reportaron niveles bajo y medio de competencia (37% y 63% respectivamente) en los cuidadores, con mayor afectación de ítems en las categorías “Conocimiento” y “Disfrutar”.

Conclusión. La necesidad de intervención de la Enfermería en el fortalecimiento de la competencia de los cuidadores es una constante importante de la actuación profesional.

COMPETENCIA DE LOS CUIDADORES DE ENFERMOS CRÓNICOS EN UNA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIO (IPS) DE CÚCUTA

Institución:

Universidad Francisco de Paula Santander, Facultad Ciencias de la Salud

Autores:

Yoli Andreína Rozo Hurtado, Elkin Herney Peñaranda Pabón, Yury Alexandra Rico Medina y Olga Marina Vega Angarita

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. Ante la magnitud de la demanda y los elevados costos en la atención formal de las enfermedades crónicas, el creciente número de cuidadores en los hogares es evidente. Ellos son quienes de manera circunstancial o voluntaria asumen la responsabilidad del cuidado de otra persona, sin contar con la competencia cognitiva e instrumental requerida.

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES

Institución:

Universidad de Córdoba

Autoras:

Luz Dary Ripoll, Concepción Amador y Elsy Puello

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. Prevenir e intervenir las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) se ha convertido en un reto para los gobiernos y para las diversas instituciones de salud y educativas, ya que muchas veces la aparición de estas genera implicaciones físicas, psicológicas y sociales que afectan incluso la calidad de vida de la persona y su familia. Así, la calidad de vida y los elementos que fomentan la satisfacción y la tranquilidad de las personas se alteran por la aparición de las ECNT.

Metodología. Estudio descriptivo transversal con enfoque cuantitativo; la información se recolectó mediante la aplicación a 36 pacientes del instrumento WHOQOL BREF, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para medir su calidad de vida.

Resultados. El 40% de los sujetos del estudio mostró poca satisfacción en relación con su salud. Al evaluar el dominio físico, se encontró que existe algún tipo de dependencia para desarrollar actividades cotidianas; en el dominio psicológico, el 50% de los encuestados se siente poco capaz de disfrutar completamente su vida, y en el dominio social se encontró que el mayor porcentaje de insatisfacción reside en las pocas oportunidades para realizar actividades de recreación y ocio.

PELÍCULA TRANSPARENTE ESTÉRIL PARA LA FIJACIÓN DE ACCESO VENOSO PERIFÉRICO: EXPERIENCIA DE SU IMPLEMENTACIÓN EN SERVICIOS HOSPITALARIOS

Instituciones:

Hospital de San José y Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

Autoras:

Ángela Agudelo, Yessica Lorena Chaparro Rojas y María Camila Moyano Gavilar

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. Los accesos venosos periféricos (AVP) pueden ocasionar eventos adversos; sin embargo la literatura reporta que el uso de película transparente estéril (PTE) los disminuye. Considerando que en el Hospital de San José la fijación se realiza con cinta de tela (CT), el Comité de Infecciones evaluó otra práctica de fijación para implementarla.

Objetivo. Describir los resultados de la prueba con el uso de PTE para la fijación de AVP.

Metodología. Con 12 pacientes, se realizaron tres fases: (1) línea de base (indicadores relacionados

con el AVP esfacelación, flebitis), (2) modificaciones en la técnica y la percepción del personal de Enfermería, y (3) seguimiento de casos seleccionados.

Resultados. Al fijar con CT no se visualiza el punto de inserción; se realiza curación cada día y cambio del AVP cada tres días. En el primer trimestre de 2017 se presentaron tres casos de esfacelación y cuatro de flebitis mecánica. El personal percibe que la PTE reduce el riesgo de contaminación, favorece el confort del paciente al disminuir venopunciones y su manipulación por visualización. Sobre facilidad de uso, cuatro participantes lo consideraron más práctico y tres expresaron que requiere más pasos. Durante la prueba con PTE no se presentaron lesiones; el tiempo de duración alcanzó hasta doce días; cuatro casos más de siete días hasta terminar el tratamiento y ocho casos de menor tiempo por egreso y desprendimientos de la fijación.

Conclusión. El uso de PTE facilita el cuidado del AVP, evita lesiones de piel o flebitis y aumenta el confort del paciente. El personal de Enfermería lo considera más seguro y práctico.

VIVENCIAS DEL PACIENTE AL MOMENTO DE RECIBIR EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER

Institución:

Universidad Francisco de Paula Santander

Autoras:

Kelly Kateherine Galvis Correa y Gloria Esperanza Zambrano Plata

Modalidad:

Póster

Resumen:

Objetivo. Analizar las vivencias del paciente en el nororiente de Colombia al momento de recibir el diagnóstico de cáncer.

Materiales y métodos. Estudio con enfoque cualitativo, con la participación de once pacientes con diagnóstico de cáncer residentes en el nororiente

de Colombia. Los datos se obtuvieron mediante entrevistas a profundidad y se realizó análisis de contenido.

Resultados. A partir del análisis de contenido surgió un tema central: el cáncer es una experiencia muy dura, y cinco categorías generales: (1) el cáncer es una enfermedad inesperada, (2) aflicción y confusión ante el diagnóstico de cáncer, (3) viviendo en incertidumbre, (4) los desafíos cotidianos del cáncer y (5) asumiendo el diagnóstico de cáncer.

Conclusión. Para los pacientes el cáncer es una experiencia muy dura, una enfermedad desconocida e inesperada que nunca creyeron llegar a padecer y que les genera aflicción y confusión. Durante el proceso oncológico la incertidumbre es constante y aparecen cambios que se convierten en desafíos para su vida. Apoyados por su familia y amigos, y con confianza en Dios, el paciente se resigna, asume la enfermedad y adopta nuevas conductas de vida.

CATEGORÍA: CUIDADO AL PACIENTE EN SITUACIÓN AGUDA Y CRÍTICA

HIPERGLICEMIA DE ESTRÉS Y RESULTADOS ADVERSOS EN PACIENTES CRÍTICOS ADULTOS. CLÍNICA LA ESTANCIA, POPAYÁN 2016-2017.

Instituciones:

Universidad del Valle y Universidad del Cauca

Autora:

Adriana Castro Mañunga

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. La hiperglicemia por estrés (HGE) —definida estrictamente como una glucemia plasmática basal >126 mg/dl (Asociación Americana de la Diabetes, 2016) en paciente sin antecedentes de diabetes— se presenta en la mayoría de los pacientes críticos y la evidencia la ha asociado con un deterioro de su pronóstico. Esta alteración en el control glicémico se manifiesta en el paciente crítico como una respuesta metabólica de adaptación frente a una enfermedad aguda y se asocia con mayor frecuencia de infecciones nosocomiales e incrementos en su morbilidad y mortalidad.

El impacto de la HGE en la evolución clínica de los pacientes críticos ha sido poco estudiado en las unidades de cuidado intensivo de nuestro país, y por lo tanto este estudio pretende proporcionar evidencia clínica del evento, su influencia en el pronóstico de nuestros pacientes críticos y la necesidad de su seguimiento y control estricto intrahospitalario.

Objetivo general. Identificar la asociación entre la HGE y la mortalidad y presencia de infecciones en pacientes críticos, médicos y quirúrgicos en una UCI adulto de III nivel de complejidad de Popayán.

Objetivos específicos. (1) Evaluar la frecuencia de HGE en la UCI; (2) caracterizar la HGE en el paciente crítico adulto, médico y quirúrgico de la

UCI; (3) identificar la relación entre HGE y mortalidad en pacientes críticos; (4) identificar la relación entre la HGE y las infecciones en pacientes críticos; (5) determinar si la HGE es un factor pronóstico independiente de mortalidad e infecciones en los pacientes críticos de nuestro medio.

Metodología. Estudio de cohorte ambiespectivo con un tamaño de muestra de 302 pacientes (cohorte expuesta 151, cohorte no expuesta 151). La población son pacientes de una UCI adultos de III nivel de complejidad, que ingresen a partir del momento cero del estudio y sean seguidos durante seis meses. Como criterios de inclusión se consideraron pacientes ingresados a la UCI de cualquier diagnóstico médico y quirúrgico, mayores de 18 años, ambos sexos, sin DM como antecedente, sin diagnóstico de sepsis al ingreso, con estancia hospitalaria prevista mayor a 48 horas, con un nivel conocido de glicemia > 140 mg/dl preprandial y > 180 mg/dl al azar, en las primeras 48 horas de hospitalización. Se incluyeron casos prevalentes al momento de inicio del estudio. Se excluyeron los fallecimientos antes de las 48 horas de la hospitalización.

Se realizó un análisis descriptivo de los datos; como medida de asociación se ha definido el riesgo relativo (RR) con un IC de 95%. En todos los casos, un valor de $p < 0,05$ se consideró estadísticamente significativo. Esta investigación está clasificada como un estudio sin riesgo.

Resultados esperados. (1) Establecer la magnitud de asociación entre HGE como un evento del paciente con enfermedad aguda sin diabetes y su mortalidad e infecciones; (2) Evidenciar clínicamente la HGE como un evento deletéreo para el paciente crítico y costo-efectivo para los sistemas públicos de salud; (3) Generar conocimientos y su apropiación en torno a la HGE en nuestras UCI; (4) Generar líneas de investigación en torno al control metabólico de paciente críticamente enfermo; (5) Divulgar los resultados a la comunidad científica mediante un artículo publicado en revista indexada, ponencias, etc.

ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ASTA (ARRHYTHMIA-SPECIFIC QUESTIONNAIRE IN TACHYCARDIA AND ARRHYTHMIA)

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Autora:

Yesica Andrea Peralta Linares

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Establecer en español una versión equivalente, válida y confiable del ASTA (Arrhythmia-specific Questionnaire In Tachycardia And Arrhythmia).

Metodología. Para determinar la validez facial se aplicó el instrumento a dos grupos: el primero de siete expertos, quienes evaluaron la claridad, comprensión y precisión; el segundo con 453 personas, quienes evaluaron comprensibilidad. Para la validez de contenido, el grupo de expertos evaluó los criterios de pertinencia y relevancia. En la validez de constructo y confiabilidad, 202 pacientes con diferentes arritmias cardíacas diligenciaron el instrumento ASTA.

Resultados. En la validez facial se obtuvo para el grupo de expertos un índice de Lawshe mayor a 0,7; para el grupo de personas, comprensibilidad de más del 90%. En la validez de contenido índice de Lawshe mayor a 0,8 y Kappa de Fleiss mayor a 0,9. La validez de constructo a partir del análisis de factores reveló la presencia de un solo factor para cada una de las dos subescalas. La confiabilidad mediante alfa de Cronbach reportó 0,8.

Conclusión. La versión en español del instrumento ASTA es válida y confiable para evaluar la carga de síntomas y su impacto en la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con arritmias cardíacas.

ESTRESORES EN CUIDADO INTENSIVO: PERCEPCIÓN DEL PACIENTE

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Autoras:

Diana Carolina Bernal Ruiz, Ingrid Tatiana Rojas Ruiz y Renata Virginia González Consuegra

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Materiales y métodos. Estudio observacional analítico de corte trasversal de 353 pacientes ingresados a la UCI entre enero de 2014 y 2015, a quienes se les aplicó la escala de “factores estresantes experimentados por los pacientes en la unidad de cuidados intensivos”. Para variables cualitativas se reportan proporciones y para variables cuantitativas media y desviación estándar. Para análisis vibariado prueba de asociación de Ji² y t de Student. Para análisis multivariado regresión logística binaria.

Resultados. Los factores estresantes fueron los relacionados con: tener preocupaciones por su salud y las repercusiones de esta en su vida diaria; no poder ir al baño; no poder cumplir con su papel en la familia; no tener control de sus actividades, y sentir dolor. El 13% de los entrevistados expresó nivel moderado o alto de estrés; la variable escolaridad ($p = 0,028$): categoría primaria ($p = 0,028$, OR = 16) y universitario (0,027, OR = 17) resultaron explicativas del nivel de estrés.

Conclusión. Para la mayoría de los entrevistados la estancia en cuidado intensivo resultó poco, o nada estresante. De la escala “factores estresantes experimentados por los pacientes en la unidad de cuidados intensivos”, las situaciones más estresoras para los pacientes son emocionales y están asociadas con la pérdida de control y el dolor.

IMPACTO ENTRE EL USO DE APÓSITOS HIDROCOLOIDES EN CUIDADO PREVENTIVO Y EL DESARROLLO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN PACIENTES DE ALTO RIESGO: ESTUDIO DE COHORTE

Institución:

Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología

Autora:

Olga Lucía Cortés Ferreira

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Aún es incierto si el uso de apósitos de piel previene las úlceras por presión (UPP). Mediante un estudio de cohorte prospectivo, examinamos la asociación entre el uso de apósitos hidrocoloides (APH) y la aparición de UPP en pacientes adultos con alto riesgo (Braden). Fueron elegibles los pacientes incluidos en el programa de prevención y cuidado de la piel, en un hospital de cuarto nivel.

El registro del desenlace (tiempo de presentación de las UPP) fue validado por enfermeras expertas. Se utilizó análisis de Kaplan Meier para la descripción y comparación del riesgo en función del tiempo entre los participantes expuestos o no a APH; se estimó Hazard Ratios por regresión multivariada con un modelo de riesgos proporcionales de Cox que incluye covariables de interés. En el estudio se incluyeron 170 sujetos, 23 expuestos y 147 no expuestos.

El 30,4% de los expuestos y el 17% de los no expuestos presentaron UPP durante el seguimiento ($p = 0,05$). El uso de apósitos muestra una tendencia de riesgo (HR 1,35, IC 95% 0,58, 3,14, $p = 0,485$), comparado con los no expuestos. Esta asociación se redujo al ajustarse por posibles variables de confusión (HR 1,06, IC 95% 0,29, 3,84 $p = 0,92$).

FACTORES ASOCIADOS CON INFECCIÓN POR ACINETOBACTER BAUMANNII EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE BOGOTÁ D. C.

Institución:

Universidad del Rosario

Autores:

Karla Jimena Ortiz Lozano, Catherine Galvis y Mario Villabón

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. En los últimos años acinetobacter baumannii se ha convertido en responsable del aumento de la incidencia de infecciones en las UCI, caracterizadas por multirresistencia a diferentes grupos de antibióticos de amplio espectro.

Metodología. Casos y controles pareado, razón 1:4, en tres cohortes de brotes por A. baumannii 2006-2010 en un hospital universitario. Cálculo del OR con confiabilidad del 95% utilizando regresión logística condicional.

Resultados. Se obtuvo una muestra de 14 casos y 56 controles. El análisis multivariado mostró asociación estadísticamente significativa entre la infección/colonización por A. baumannii y algún estado de inmunosupresión (OR = 15,45; IC 95% = 1,12-212,44) y tener catéter venoso central mayor a diez días (OR = 13,74; IC 95% = 1,25-151,44). No existe asociación estadísticamente significativa entre infección/colonización y mortalidad. De 14 casos, 13 presentaron aislamientos multirresistentes, 9 de origen respiratorio, 2 hemocultivos y 3 abdominal. La mortalidad en los casos no está asociada con procesos de inmunosupresión, bacteremias e infecciones/colonizaciones respiratorias.

Conclusiones. La infección/colonización por A. baumannii se asoció con estado de inmunosupresión del paciente y catéter venoso central mayor a 10 días, correlacionada con la intervención invasiva, frecuente en las UCI. No fue posible establecer diferenciación entre infección y colonización, y su asociación con la mortalidad de los pacientes.

IMPLEMENTACIÓN DE UN COMITÉ DE CALIDAD DEL CUIDADO EN ENFERMERÍA EN LA CLÍNICA SOTOMAYOR DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA DE GUAYAQUIL, ECUADOR, 2017-2018

Institución:

Hospital Luis Vernaza de Guayaquil

Autoras:

Ketty Azucena Sánchez Vera, Ana Salgado Salguero y Miriam Cañada Ruiz

Modalidad:

Póster

Resumen:

El incumplimiento del deber que tienen las licenciadas y las auxiliares de cubrir las necesidades básicas de los pacientes con agilidad y prontitud, con una actitud cordial y efectiva mientras se ejecutan los procedimientos de atención de Enfermería en las actividades diarias, ha conllevado a disminuir la calidad del cuidado del paciente hospitalizado de la Clínica Sotomayor.

Para mejorar esta situación, proponemos implementar un comité de calidad que supervise que los procedimientos se cumplan de forma ordenada, ágil y efectiva.

En este póster presentamos los datos obtenidos durante la prueba piloto realizada a los pacientes ingresados en la Clínica Sotomayor.

La encuesta probó ser útil en la recolección de datos, y su validez estadística será comprobada más adelante.

Objetivo general. Mejorar la calidad del cuidado en la Clínica Sotomayor.

Objetivo específico. Analizar si la atención en la calidad del cuidado es ordenada ágil, oportuna y efectiva.

Instrumentos. Encuesta. Para obtener datos demográficos sobre la encuesta se incluyen cuatro preguntas acerca de si la atención recibida fue adecuada, su trato fue cordial, los procedimientos fueron ordenados, ágiles y efectivos.

Metodología. Población: 57 pacientes ingresados a la Clínica Sotomayor.

CATEGORÍA: SALUD MENTAL

SALUD MENTAL EN DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, BASADA EN EL MODELO DE ENFERMERÍA ROPER-LOGAN-TIERNEY, CARTAGENA 2016

Institución:

Corporación Universitaria Rafael Núñez

Autores:

Zorayda Barrios Puerta, Anderson Díaz Pérez y Moraima del Toro Rubio

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Analizar el estado de salud mental de los desplazados del barrio Villa de Aranjuez, a partir de los elementos propuestos por Roper-Logan-Tierney. *Materiales y métodos.* Descriptivo de corte transversal. Población: 500 personas desplazadas. Muestra: 314 adultos mayores de 18 años con margen de error del 5% y nivel de confianza del 95%. La información se recolectó a partir de encuestas con preguntas cerradas a las víctimas.

Resultados. La incidencia de la violencia en los desplazados fue de un 70% que dice haber presentado estrés después del desplazamiento. Dentro de las secuelas se encuentra que un 48,33% se ha sentido discriminado socialmente, un 65% ha sentido abandono del Gobierno y un 41,67% dice haber cambiado su forma de ser.

Los componentes de Roper-Logan-Tierney dejan ver en forma general cuáles consideran los desplazados que han sido las actividades afectadas, así: desarrollo de ambiente seguro 67%, alimentación y bebida 37%, limpieza personal y vestido 23%, movilización 35%, trabajo y juego 32%, sueño 28% y muerte 52%.

Conclusiones. Las personas que han sido víctimas del conflicto armado desencadenan una serie de conflictos internos por los cambios en su estilo de vida, que alteran sus necesidades básicas y su salud

mental. Por eso es cada vez más necesario crear programas asistenciales en el aspecto psicológico, como medida importante para que ellas puedan continuar enfrentando los cambios que les ha traído el desplazamiento.

ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO, UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Autores:

Nathalya Garzón Amórtegui, Edwin Humberto Muñoz Parra, Angélica María Otero Guerrero y Jorge Hernando Villamil Henao

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Desde hace más de cincuenta años Colombia ha vivido una situación de conflicto armado que ha afectado a su población. La atención psicosocial es el conjunto de acciones encaminadas al cuidado holístico de las personas, comunidades o población que tuvieron alguna experiencia traumática.

Objetivo. Identificar cuáles son las intervenciones que se realizan dentro del enfoque psicosocial a la población afectada por el conflicto armado colombiano, mediante una revisión sistemática.

Materiales y métodos. Se utilizó el recurso bibliográfico ofrecido por el Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad Nacional (Sinab).

Resultados. “Descubridor”, el cual arrojó 20 artículos de revistas, de los cuales fueron seleccionados 10. Se agruparon los resultados en siete categorías: redes y apoyo social; mecanismos de afrontamiento; dolor y sufrimiento; estandarización de la atención; trabajo interdisciplinar; memoria histórica, y reparación.

Conclusiones. Las víctimas del conflicto armado son sujetos activos dentro de su proceso de re-

cuperación. Sin embargo requieren de acompañamiento continuo y trabajo multidisciplinar de profesionales con pleno conocimiento y habilidad para abordar el contexto del conflicto armado, que reconozcan el dolor y sufrimiento no como una entidad patológica sino como una reacción normal a los eventos traumáticos, y que además sean capaces de generar intervenciones definidas a partir de la identificación de los procesos endógenos de cada persona y reconozcan la importancia que ejerce la red de apoyo sobre dicho proceso.

SALUD MENTAL COLECTIVA: IMPACTOS EN POBLACIÓN AFECTADA POR CONFLICTO ARMADO. CALDONO, CAUCA, 2017

Institución:

Universidad del Cauca

Autores:

Elisa Jojoa Tobar, Jesús Andrés Bonilla Muñoz, Nory Estefanía López Guerrero y Aura Milena Muñoz Oviedo

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. El conflicto armado en Colombia sigue afectando de manera importante a la población civil; en el Municipio de Caldonó, Cauca, se registraron diferentes hostigamientos, atentados y otros eventos.

Objetivo. Reconocer el impacto de la violencia en la salud mental colectiva y entender esta como la relación armoniosa entre la familia, la comunidad y el territorio.

Materiales y métodos. Investigación cualitativa de enfoque fenomenológico.

Resultados. El impacto en la familia se evidenció en desplazamientos, pérdida de relaciones significativas y atomización del núcleo familiar e incremento de conflictos familiares por la militarización de la vida civil. El modo de vida familiar se vio afectado

por manifestaciones de ansiedad y el uso de alcohol como mediador en el manejo de la ansiedad.

Conclusiones. Las situaciones de conflicto armado generaron en el colectivo un afianzamiento en la necesidad de defender la vida y el territorio, lo que generó procesos de reconciliación entre grupos étnicos y fortaleció los procesos organizativos comunitarios en torno a la resistencia civil. Sin embargo la salud mental de la comunidad también se vio comprometida por la pérdida de los espacios comunitarios para el desarrollo de actividades sociales y comunitarias, la estigmatización social, la persecución a líderes sociales y funcionarios de estamentos públicos, y la falta de desarrollo por ausencia de inversión social, entre otros.

EL ROL DE LA CRIANZA PARENTAL Y EL AJUSTE PSICOSOCIAL EN ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE DROGAS

Institución:

Universidad Veracruzana, México

Autora:

Karina Díaz Morales

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Examinar la crianza parental y el ajuste psicosocial en adolescentes consumidores de drogas.

Métodos. Diseño transversal predictivo, con muestra probabilística de 377 adolescentes escolares, quienes diligenciaron instrumentos validados, previo consentimiento escrito de los tutores. Se realizó análisis de regresión logística binaria utilizando el software SPSS V.22

Resultados. Se detectó que la probabilidad del consumo diario de tabaco está presente por la calidez y el favoritismo de ambos padres. El “rechazo y favoritismo mamá” y “la calidez papá” incrementan la probabilidad de consumo de alcohol de más de tres copas por ocasión, y con más de cinco veces

en el último año. La “calidez papa” explicó la probabilidad del consumo de mariguana. En el ajuste psicosocial, las redes sociales desviantes se asocian con la probabilidad de consumo de alcohol de más de tres copas por ocasión con más de cinco veces en el último año. La adherencia escolar y la competencia social explican el consumo diario de tabaco. La competencia social y las redes sociales desviantes incrementan el riesgo de consumo de mariguana. La autoestima se asocia con la posibilidad de consumo diario de tabaco.

Conclusiones. Los adolescentes perciben diferente crianza parental y tienen problemas de ajuste psicosocial aumentado el riesgo del consumo de drogas.

Hye Ri, ejecutada en violín; (3) mediciones por tres semanas consecutivas con tres tiempos de duración (10,15 y 20 minutos) de musicoterapia, para determinar tiempo efectivo. Una vez seleccionada la canción y la duración de las sesiones de musicoterapia se realizaron sesiones diarias para identificar los cambios en las mediciones antes y después de las cifras tensionales y la frecuencia cardíaca.

Resultados. El porcentaje de cambio en las mediciones de cifras tensionales y de frecuencia cardíaca a los 10 minutos fue del 10%, a los 15 minutos fue del 7% y a los 20 minutos fue del 5%.

Conclusión. Una vez más se considera la musicoterapia como un método de relajación.

EFFECTO TERAPÉUTICO DE LA MÚSICA EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA

Institución:

Universidad Industrial de Santander

Autores:

Beatriz Villamizar Carvajal, Diego Fernando Santisteban Pérez, Zayda Katherine Valero Cárdenas, Silvia Juliana Carreño Porras y Anny Natalia Ojeda

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. La musicoterapia induce a estados de relajación con la consecuente disminución de las frecuencias cardíaca y respiratoria y de la tensión arterial, lo que demuestra su eficacia en diversos ambientes que generan estrés y ansiedad.

Objetivo. Describir el efecto de la musicoterapia en los niveles de presión arterial y frecuencia cardíaca en estudiantes de Enfermería.

Metodología. Estudio piloto con estudiantes de Enfermería —desde octubre del 2016 hasta mayo del 2017—, en tres fases: (1) sesiones de musicoterapia por 10 minutos con canciones seleccionadas por cada estudiante; (2) elección de canción que mostraba más cambios, la cual fue Natseon Hae by Park

LA HISTORIETA-FANZINE COMO UNA HERRAMIENTA DE REHABILITACIÓN DE BASE COMUNITARIA EN UNA POBLACIÓN CON TRASTORNO MENTAL SEVERO (TMS)

Institución:

Fundación Universitaria Juan N. Corpas

Autora:

Martiza Barroso Niño

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. El TMS, catalogado como problema de salud pública, invita a los organismos internacionales, como la Organización MS, que informa la prevalencia de trastornos mentales en algún momento de la vida en el 6,8% de la población. Se espera que para 2020 la depresión sea la primera causa de carga de la enfermedad en el mundo. En el Grupo de Investigación Cuidarte, de la Escuela de Enfermería de la FUJNC, en asociación con A. Saludarte, venimos trabajando en la investigación denominada “Cuidado de enfermería y herramientas terapéuticas, pedagógicas y de participación comunitaria en el manejo de un grupo de pacientes

con TMS en el marco de la Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC)", la cual ha sistematizado varias herramientas.

Objetivo. Mostrar la experiencia de la herramienta "Historieta-Fanzine" y su influencia en el control de síntomas psiquiátricos.

Metodología. En un primer momento, 25 residentes en A. Saludarte-2017 realizan un taller cognitivo elaborando guiones, y en un segundo momento los guiones pasan a pintura para transformarse en historieta. Producción comunitaria que aporta al sujeto colectivo, la convivencia y sus lazos.

Resultados. Se analizan los dibujos, aspectos de la ocupación y funciones mentales que se ubican en este lugar de transición entre la interioridad y la ejecución. El efecto positivo en control de síntomas de los residentes estudiados nos estimula a su difusión.

Objetivo. Desarrollar espacios de cuidado para la persona privada de la libertad que refuercen el afrontamiento e induzcan procesos de autoidentificación de conductas saludables en el marco de la formación de profesionales de Enfermería.

Metodología. Se construyó e implementó un proyecto de aula según el enfoque de aprendizaje por proyectos y fundamentado epistemológicamente en el Modelo de Resignificación del Cuidado de la salud Mental construido por los investigadores. Se utilizó el taller como instancia pedagógica y la metodología enfermera NANDA, NOC y NIC para el desarrollo de las acciones de cuidado.

Resultados. Se comprobó la validez de las acciones propuestas por el Modelo, las cuales permitieron identificar líneas de acción del cuidado en el contexto del trabajo y las estrategias didácticas innovadoras que potenciaron aprendizajes significativos sobre cuidado para la salud mental.

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA: CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN EL CONTEXTO PENITENCIARIO SEGÚN EL ENFOQUE DEL MODELO DE RESIGNIFICACIÓN DEL CUIDADO. YOPAL, 2017

Institución:

Fundación Universitaria de San Gil - Unisangil

Autores:

Alexander León Puello e Iván Javier Peñaloza Vergel

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

El cuidado de la Enfermería en Salud Mental tiene como meta el fomento de la autoidentificación de conductas que permitan el fortalecimiento de los mecanismos de afrontamiento. En el contexto carcelario existen condicionantes para la salud mental que pueden socavar estos mecanismos, por lo que la Enfermería, desde su rol cuidador, genera espacios de reflexión y acción para el cuidado autoestructurante que permitan reforzar dichos mecanismos.

USO DE INTERNET, CONSUMO DE ALCOHOL Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN ADOLESCENTES DE SECUNDARIA

Institución:

Universidad Veracruzana

Autoras:

Leticia Cortaza Ramírez, Francisca Elvira Blanco Enríquez, Brenda Alicia Hernández Cortaza, Lizeth Alejandra Lugo Ramírez y Marian Litzel Jerónimo Azuara

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Conocer la relación entre el uso de internet, el consumo de alcohol y la funcionalidad familiar de adolescentes de secundaria.

Metodología. Estudio cuantitativo, descriptivo correlacional y transversal realizado con una muestra de 252 estudiantes seleccionados mediante muestreo aleatorio simple estratificado. Las herramientas

tas utilizadas fueron el Test de Adicción a Internet (Young, 1998), Audit (OMS, 1989) y el Apgar familiar (Smilkstein, 1978).

Resultados. El 57,5% de los participantes utiliza internet controladamente, el 38% refiere uso problemático y en el 4,5% es adictivo. El 95,2% indica consumo de alcohol de bajo riesgo, el 2,7% de riesgo, el 1,1% perjudicial y el 1% dependiente. El 71,1% reporta alta funcionalidad familiar, el 18,2% media y el 10,7% baja.

Las mujeres muestran mayor porcentaje de uso de internet problemático (39,8%) y adictivo (5,8%), al igual que en consumo de alcohol de riesgo (4,4%) y perjudicial (1,2%). En las mujeres predomina la funcionalidad baja (15,4%). Existe relación positiva entre el uso de internet y el consumo de alcohol $r = 0,181$ ($p = 0,004$), el uso de internet y la funcionalidad familiar $r = -0,281$ ($p = 0,000$). Se concluye que la relación del uso de internet con el consumo de alcohol y la funcionalidad familiar puede indicar deterioro de la comunicación en la familia, además de realizar el uso de sustancias, especialmente en las mujeres.

CARACTERIZACIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE AMÉRICA LATINA

Institución:

Universidad Manuela Beltrán

Autor:

Edgardo Javier Muñoz Beltrán

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. Dentro del área de la salud los profesionales de Enfermería están considerados como el grupo de más alta prevalencia de padecer de estrés, y por consiguiente de padecer del Síndrome de Burnout. La forma de afrontar y caracterizar la enfermedad es la clave para su prevención.

Objetivos. Caracterizar mediante una revisión sistemática la presencia del Síndrome de Burnout en los profesionales de Enfermería que trabajan en las unidades de cuidados críticos de Latinoamérica y el Caribe.

Métodos. Revisión sistemática de bases de datos indexadas.

Conclusiones. El conocimiento desarrollado se enfoca principalmente sobre las estrategias eficaces de afrontamiento, la resolución de conflictos y la caracterización del Síndrome de Burnout como acción fundamental de afrontamiento en su prevención en los profesionales de Enfermería que trabajan en las unidades de cuidados intensivos de Latinoamérica y el Caribe.

PERFIL DE LOS CUIDADORES DE PACIENTES ADMITIDOS EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

Institución:

Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo (EERP-USP)

Autoras:

Tássia Ghissoni Pedroso, Juceli Andrade Paiva Mero, Angélica da Silva Araújo, Sandra de Souza Pereira y Lucilene Cardoso

Modalidad:

Póster

Resumen:

Objetivo. Trazar el perfil de los cuidadores familiares de pacientes admitidos en un hospital psiquiátrico del interior del estado de São Paulo.

Metodología. Entrevistas realizadas individualmente con cada persona cuidadora, en sala reservada en el servicio, mediante un cuestionario sociodemográfico y respetando todas las cuestiones éticas. Participaron 112 cuidadores familiares.

Resultados. El 82% son del sexo femenino y casadas (59%). La edad media fue de 49 años ($\pm 12,8$, 23-77 años), el 54% eran madres y el 83,9% tenía una religión. El 57,1% no completó la secundaria y el 60,7% trabajaba. En cuanto al estilo de vida,

el 77% no practicaba actividad física y el 68% relató presentar problemas de salud, siendo más frecuente la diabetes (25%), seguida por la hipertensión arterial sistémica (41%) y la depresión (16%). Entre los cuidadores, el 60,7% usaba medicamentos y el 23% psicotrópicos.

Conclusiones. Se verificó que los cuidadores familiares tenían afectada su salud, por lo que los profesionales de la salud los deben alentar y enfocarse en acciones de salud dirigidas también a ellos, no solo al paciente que se interna.

ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE UNA UNIVERSIDAD DE CÚCUTA

Institución:

Universidad Francisco de Paula Santander

Autora:

Diana Carolina Silva Sánchez

Modalidad:

Póster

Resumen:

Objetivo. Describir el estrés académico en los estudiantes de Enfermería de una universidad pública de Norte de Santander para diseñar una propuesta de intervención.

Materiales y método. Investigación cuantitativa y descriptiva. Para el análisis de la información se tuvo en cuenta un cuestionario Sisco. Se elaboró la descripción de cada una de las variables con su respectivo análisis, además de la propuesta de intervención.

Resultados. Los estudiantes de Enfermería manifestaron que algunas veces durante el semestre tienen estrés; antes y durante las prácticas el nivel de estrés es medianamente alto y después de estas el nivel es medio. En cuanto a las reacciones físicas, los estudiantes presentaron con más frecuencia somnolencia, trastornos del sueño, dolor de cabeza y fatiga crónica. Las reacciones psicológicas fueron inquietud, ansiedad, angustia y problemas de concentración, y las reacciones comportamentales

aumento o reducción del consumo de alimentos y desgano para realizar labores escolares.

Conclusiones. La Enfermería como disciplina de la salud y cuerpo docente del programa académico debe actuar para que los estudiantes no se vean afectados por el estrés académico. Es por ello que se realiza una propuesta de intervención basada en el modelo de Enfermería de Hildegard Peplau.

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA CON TECNOLOGÍAS MULTIMEDIA PARA PROMOVER LA SALUD MENTAL EN ESTUDIANTES DEL ÁREA DE LA SALUD

Institución:

Universidad de Cartagena

Autores:

Muna Handam Rodríguez, Irma Castillo Ávila y Luis Alvis Estrada

Modalidad:

Póster

Resumen:

Objetivo. Describir la experiencia pedagógica de promover la salud mental utilizando tecnologías multimedia en estudiantes del área de la salud de una universidad pública de Cartagena.

Metodología. Se describen los contenidos del módulo de Salud Mental —del curso Salud y Vida— desarrollado por estudiantes del área de la salud de una universidad pública de Cartagena. Este es un curso que utiliza la metodología de “ciclos de conferencias” y se apoya en la realización de talleres, paneles, discusiones de grupo y una plataforma virtual en la que se refuerzan los contenidos y se intercambian experiencias personales y grupales, a través de foros y wikis. Estas experiencias tienen el fin de promover conductas saludables en la salud mental.

Resultados. De los testimonios y las entrevistas de los estudiantes se deduce que ellos reconocen la importancia del cuidado de la salud mental como parte integral del ser humano y como un aspecto

que puede potenciar la salud o perjudicar el avance de una persona.

Conclusiones. El fomento de la promoción de conductas saludables en salud mental es un factor importante en la formación de los profesionales de la salud, para sensibilizarlos y crear en ellos la cultura del cuidado y de su rol como agentes cuidadores de esta.

CATEGORÍA: EDUCACIÓN EN SALUD Y ENFERMERÍA

INFLUENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL AUTOCUIDADO DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA COLOMBIANOS. 2015-2016

Institución:

Universidad de Caldas

Autoras:

María del Pilar Escobar Potes, Ángela María Mejía Uribe y Sonia Inés Betancur López

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Describir la influencia de la formación profesional en el autocuidado de estudiantes de Enfermería colombianos.

Metodología. Estudio descriptivo con componente cualitativo. Muestra de 487 estudiantes. Se aplicó encuesta y realizaron entrevistas a profundidad previo consentimiento.

Resultados. El 86% de la muestra fueron mujeres; edad del 74,3%, 18 a 24 años; 56% procedía de capitales; 85,2% solteros; 40% vivía con sus padres y 60,4% dependían económicamente de ellos; 74% solo estudian.

Durante la carrera se adquirieron: prácticas de autocuidado: 29,6% cuidado de la piel y 30,2% asistencia a programas de promoción y prevención; se abandonaron: 65,2% recreación y tiempo de ocio y 76,2% actividad física; se cambiaron positivamente: 47,84% habilidades para vivir, 22,8% patrones de alimentación y 32,4% prácticas preventivas en ejercicio de sexualidad.

Se iniciaron o incrementaron prácticas de riesgo: automedicación y consumo de bebidas energizantes. “La imagen saludable y la motivación del docente hacia el autocuidado”; “la coherencia entre lo que se enseña y las actuaciones”, “la estructura curricular de los programas, consolida valores y comportamientos de autocuidado”. “Antes me

cuidaba, pero lo hacía porque me gustaba, ahora sé por qué conclusiones: La formación profesional por medio de los currículos real y oculto incide en el autocuidado de los estudiantes.

Conclusiones. El nivel de conocimiento acerca de salud sexual y reproductiva es regular. La mayoría de los estudiantes utiliza al menos un método de planificación familiar en sus relaciones sexuales.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: MÁS ALLÁ DEL CONOCIMIENTO Y LAS PRÁCTICAS

Institución:

Universidad del Cauca

Autores:

Ivett Adriana Herrera Zuleta, Jonathan Fernando Reyes Salazar, Katherine Patricia Rojas Velasco, Magda Lizeth Tipán, Carlos Andrés Torres López, Lina Marcela Vallejo Trujillo y Luis Felipe Zemanate Ordoñez

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Describir el conocimiento y las prácticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva en los estudiantes de una universidad del suroccidente colombiano.

Materiales y métodos. Investigación cuantitativa-descriptiva de corte transversal; en estudiantes matriculados en primer y segundo semestre del primer periodo de 2016; la muestra se obtuvo por medio de la fórmula de varianza desconocida, y se obtuvo un resultado de 415 estudiantes. Los datos se procesaron a través de paquete estadístico SPSS versión 22; para determinar la significación de la asociación se utilizó la prueba chi cuadrado.

Resultados. Población estudiada con 50,7% del género masculino; la edad promedio de los estudiantes fue de 19 años, el 81% de ellos en etapa de adolescencia tardía; el 62% tiene un nivel de conocimientos regular, el 78% inicio vida sexual con edad promedio de 16 años, un gran porcentaje de estos estudiantes tiene entre 1 y 3 compañeros(as) sexuales; el 70% utilizó condón en su primera relación sexual y el 12,3% de la población utilizó la píldora de emergencia.

DISEÑO DE UN OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS CON UNA MALA TÉCNICA EN LA INSERCIÓN DE CATÉTER URINARIO

Institución:

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

Autoras:

María Consuelo Gaitán, Mariana Alejandra Andrade Díaz y Lina María Landinez Méndez

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Las infecciones del tracto urinario asociadas con catéter vesical (Ituac) generan afectación clínica y social para las personas y aumento en costos intrahospitalarios. Las Ituac se pueden prevenir usando una técnica adecuada; aquí la formación continua es fundamental. Estudios muestran que el uso de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) en la formación continuada contribuye significativamente a la prestación de cuidados de Enfermería.

Objetivo. Determinar el efecto de la implementación de un OVA de inserción de catéter urinario en el Hospital de San José sobre la incidencia de infecciones asociadas con una mala técnica.

Materiales y métodos. Estudio pre y pos intervención de cuatro fases: (1) diseño del OVA siguiendo el modelo ADDIE; (2) diagnóstico de los conocimientos (pretest) e indicadores de Ituac; (3) implementación del OVA, y (4) evaluación (postest). *Resultados.* Se construyó un OVA de 4,5 horas. Se realizó el diagnóstico con todos los profesionales de Enfermería, y se evidenció el impacto de la implementación del OVA en el mejoramiento de los

conocimientos del personal y en la reducción de las Ituac.

Conclusiones. La implementación de un OVA permite difundir, disminuir y evitar el uso prolongado de un cateterismo urinario para evitar la prevalencia de infecciones.

Metodología. Investigación exploratoria descriptiva explicativa. Se da por fases a partir del movimiento integrado, el cuidado de sí mismo, la creatividad en las prácticas de cuidado, el cuidador como vehículo del afecto y la espiritualidad del cuidador.

AMORIZAR EL CUIDADO COMO CAMINO EN LA SALUD PARA SER APLICADO EN LA FORMACIÓN DE ENFERMERÍA

Institución:

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Autora:

Luz Stella Saray Rubio

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. La construcción teórica de la experiencia pedagógica “vivencia biocéntrica” —porque su referencia está en la vida, genera vida, es integradora y se aplica en Enfermería amorizar el cuidado— se utiliza como estrategia de movimiento vivencial del sistema biodanza® y de las teorías del cuidado humano desarrolladas por diferentes teóricos de la Enfermería, fortaleciendo potenciales genéticos a través de cinco líneas de vivencia: vitalidad, sexualidad, creatividad, afectividad y trascendencia.

El acto de educar se presenta como acto de vivir, de cultivar la vida y sus posibilidades de manifestación, lo que permite transformar el pensamiento, el sentimiento y la acción, creando redes de cuidado y atención solidaria, como un acto de amor, una danza de germinación. Una educación que desarrolla principalmente la afectividad, que profundiza los vínculos y genere el desarrollo de la inteligencia afectiva.

Objetivo. Sensibilizar al personal de Enfermería en su desarrollo humano para amorizar el cuidado a partir de su propia capacidad de autoobservación, autorreconocimiento y autocuidado, de modo que impacte en su entorno laboral, familiar, social y espiritual.

SATISFACCIÓN DE SIMULACIÓN DE COMPETENCIAS NO TÉCNICAS EN ALUMNOS DE CUARTO AÑO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, SANTIAGO DE CHILE

Institución:

Universidad de los Andes, Santiago de Chile

Autora:

Carolina Jerez

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. La simulación clínica es una “técnica para sustituir o ampliar las experiencias reales con experiencias guiadas” (Angulo, 2016). Los alumnos desarrollan competencias gradualmente. En este contexto, es importante la adquisición de habilidades relacionadas con la conciencia y la comunicación que se desarrollan por medio de las simulaciones de alta fidelidad de habilidades no técnicas. **Objetivos.** Evaluar la satisfacción de los alumnos en las habilidades no técnicas en consejería VIH en simulación clínica.

Material y método. Estudio de tipo descriptivo. Los alumnos asisten en grupos, reciben un guion para desarrollar el escenario (Enfermero/paciente) y deben representarlo mientras son observados en la sala espejo. Al finalizar se realiza el “Debriefing” (Angulo, 2016). Se aplica una encuesta anónima, contestada por el 100% de los alumnos.

Resultados. El 100% de los encuestados reconoce que la actividad es un aporte para su aprendizaje y atinente a su formación. Alta satisfacción de simulación de competencias no técnicas, 90% califica con nota 7 (escala de 1 a 7).

Conclusión. La simulación clínica de alta fidelidad en habilidades no técnicas ha tenido una evaluación altamente satisfactoria.

Referencia. Angulo, M. C. (2016). La simulación como metodología para el aprendizaje de habilidades no técnicas en Enfermería. Tesis de grado. Valencia.

inciden en la configuración de la identidad profesional enfermera y emergen elementos para seguir investigando acerca de la identidad profesional de los enfermeros y estudiantes de Enfermería colombianos. Se plantea una propuesta de lineamientos educativos para fomentar la identidad profesional enfermera desde un programa de pregrado.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONFIGURACIÓN DE LA IDENTIDAD “PROFESIONAL ENFERMERA”

Institución:

Fundación Universitaria Juan N. Corpas

Autora:

María Antonina Román Ochoa

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. El problema de investigación está relacionado con aquellos factores que pueden influir en la configuración de la identidad “profesional enfermera” y en el ejercicio orgulloso y empoderado de la profesión. Se presentarán los resultados del primer objetivo específico de la tesis doctoral “Lineamientos educativos para fortalecer la identidad profesional desde un programa de pregrado en enfermería”: identificar los aspectos que influyen en la configuración de la identidad del profesional de Enfermería.

Metodología. Esta investigación doctoral se realizó en dos etapas: diagnóstica y profundización. Se expondrá el resultado de la revisión documental, consistente en el análisis de alrededor de 120 artículos en español e inglés. Se identificaron múltiples elementos que influyen en la configuración de la identidad profesional y se centró la atención en aquellos que se pueden abordar en la formación de pregrado.

Resultados: La investigación hace un aporte en lo relacionado con aspectos de conceptualización e interrelaciones establecidas entre los factores que

MODELO TEÓRICO: “ENSEÑANDO EL CUIDADO HUMANO COMO UN PROCESO COMPLEJO DE INTERACCIONES VIVENCIADAS, COMPARTIDAS Y RECONOCIDAS EN LA PRÁCTICA”

Institución:

Universidad Mariana

Autora:

Mildred Rosero Otero

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

El cuidado humano se constituye en la razón de ser de la disciplina de la Enfermería, por lo tanto es necesario que las instituciones formadoras brinden metodologías de enseñanza que lleven al aprendizaje del cuidado humano en los actores involucrados: docentes y estudiantes, y de esta manera este se haga evidente en la práctica y en el ejercicio laboral. La presente investigación es el resultado de la tesis doctoral “Comprendiendo la enseñanza del cuidado humano en Enfermería que se realizó en la Universidad Mariana de Pasto, Colombia, y que tuvo como objetivos: comprender los significados atribuidos por los sujetos involucrados (docentes, estudiantes y egresados) en la experiencia de enseñar y aprender el cuidado humano, y construir un modelo teórico y procesual de conocimientos y prácticas aportados por esta experiencia en el Programa”.

Se utilizó el referencial de la teoría de la complejidad de Edgar Morin, la trayectoria metodológica se

sustentó en la teoría fundamentada en los datos y se realizaron entrevistas a profundidad a los cuatro grupos muestrales conformados por docentes directores, docentes de teoría y práctica, estudiantes y egresados del Programa. Investigar este fenómeno permitió reconocer que este proceso es complejo y que diariamente se construye en el acto de enseñar y aprender el cuidado humano.

FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS CON LA INTERRUPCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES CON NIÑOS MENORES DE SEIS MESES. HOSPITAL DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE, 2017

Institución:

Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde

Autoras:

Geny Rivera Salazar y Herlinda Espinoza Villamar

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Estudio tendiente a determinar los factores socioculturales que influyen en la interrupción de la lactancia materna exclusiva antes de los seis meses de vida (2017), realizada en el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E., de Guayaquil (Ecuador), fundamentada en la teoría de la diversidad y la enfermería transcultural.

Metodología. Estudio mixto, de corte transversal con enfoque cuali-cuantitativo, cuya modalidad de estudio es el “Método de análisis - Síntesis e inductivo-deductivo”. Para la recolección de la información se aplicó una encuesta y se estableció un grupo focal, se realizó el método de triangulación de los datos que permite el análisis del cuestionario aplicado y de la observación participativa del grupo focal. Los resultados fueron categorizados y sus resultados son los núcleos del sentido, estudio que permite realizar las propuestas de mejora cuya beneficiada será la comunidad infantil.

RECONOCIMIENTO DE ACCIONES DESDE LA RESISTENCIA A LAS IDENTIDADES BINARIAS DE GÉNERO Y SEXUALES, DE LAS PERSONAS EN ESCENARIOS DE EXCLUSIÓN

Instituciones:

Universidad del Quindío y Universidad de Manizales

Autoras:

Carmen Ayde Fernández Rincón y Norma Liliana Ruiz Gómez

Modalidad:

Póster

Resumen:

Metodología. Investigación abordada con el enfoque metodológico cualitativo, desde la propuesta hermenéutica-fenomenológica de Paul Ricoeur.

La línea teórica está constituida por dos áreas del conocimiento a interrelacionar: la primera, que me involucra directamente como enfermera es el constructo teórico de las ciencias de la salud que abarcan sexualidad, educación sexual, salud sexual y reproductiva, y derechos sexuales y reproductivos. La segunda línea teórica desde mi proceso de formación doctoral, la aportan las ciencias sociales, a partir de teorías contrasexuales, los dispositivos sociohistóricos de la sexualidad, algunas apuestas teóricas que contraponen los conceptos de sexo/género y las teorías de descolonialismo y sexualidad.

Resultados: La exclusión, identificada por estadios, está entre la integración social y la completa postergación. La resistencia toma un espacio importante en esta investigación; una de las definiciones más utilizada y menos analizada conceptualmente, en esta investigación se constituirá y construirá teóricamente articulándolo con los conceptos de género, relación sexo/genero, heterosexualidad, discriminación, y exclusión.

NIVELES DE CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA PARA EL CUIDADO DE LA MUJER DURANTE LA GESTACIÓN, EL PARTO Y EL PUERPERIO

Institución:

Universidad Industrial de Santander

Autoras:

Carolina Vargas Porras y María Teresa Fajardo Peña

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. La evaluación por competencias se debe derivar de un modelo de formación por competencias, lo que implica cambios en la organización del sistema educativo y una reflexión pedagógica. Es necesario realizar una evaluación del logro de las competencias relacionadas con el cuidado de la mujer durante la gestación, el parto y el puerperio, máxime cuando en la actualidad en Colombia toma relevancia la reglamentación de la atención del parto por parte de la Enfermería.

Objetivo. Evaluar los niveles de cumplimiento de las competencias desarrolladas en estudiantes de Enfermería de la UIS, para el cuidado de la mujer durante la gestación, el parto y el puerperio.

Metodología. Estudio descriptivo de corte transversal con una muestra de 170 estudiantes. Se calcularán los porcentajes de las variables en escala de medición cualitativa, junto con sus intervalos de confianza al 95%. Las variables continuas se especificarán con medidas de tendencia central y de dispersión; las continuas con distribución normal se resumirán con rango, intervalo, promedio y desviación estándar, y las que no sean normales con la mediana y el rango intercuartil.

Implicación. Se espera que los resultados de este proyecto aporten en los procesos de formación maternoperinatal, dado que la evaluación orienta el currículo.

FACTORES DE DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA: COHORTES 2012 A 2015

Institución

Universidad Surcolombiana

Autores:

José Camilo Segura Cortes, Julieth del Rosario Salas Mosquera, Eliana Andrea Laguado Cerón, Diego Omar Pérez Campos, Angie Vanessa Vanegas Vanegas y Juan Camilo Calderón Farfán

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. En el mundo la deserción universitaria en Enfermería afecta los sistemas de salud, ya que la fuerza de trabajo recae mayoritariamente en el personal de Enfermería.

Objetivo. Describir los factores de deserción de los estudiantes que abandonaron el Programa de Enfermería de la Universidad Surcolombiana de las cohortes 2012-1 a 2015-1.

Metodología. Estudio cuantitativo-descriptivo de corte transversal. La información fue recolectada por encuesta electrónica, conservando las consideraciones éticas en investigación.

Resultados. La mayoría de desertores fueron jóvenes entre los 19 y 21 años, con predominio del sexo femenino, de niveles socioeconómicos bajo y medio, solteros, procedentes del departamento del Huila, que se encontraban estudiando al momento de la encuesta.

Los principales factores asociados con la deserción en Enfermería fueron: interés por otra carrera afín a ciencias de la salud (83,5%), desmotivación por la carrera (54,6%), insatisfacción por el programa (41,2%), bajo reconocimiento social (27,7%) y bajo reconocimiento salarial de la profesión (26,8%).

Conclusión. La deserción en Enfermería se asocia principalmente con factores personales y sociales que influyen en la decisión de desertar de la carrera. Para la intervención del fenómeno de estudio se hace relevante el fortalecimiento gremial y la visibilización social de la Enfermería.

ESTILOS DE APRENDIZAJE: UN PASO PARA EL MEJORAMIENTO EN LA EDUCACIÓN DE ENFERMERÍA

Institución:

Corporación Universitaria Adventista

Autoras:

Giselly Matagira Rondón, Martha Cecilia Torres Pannesso y Natalia Berrío Osorio

Modalidad:

Póster

Resumen:

Objetivo. Determinar los estilos de aprendizaje y los factores relacionados en estudiantes de Enfermería de una universidad de Medellín, con el propósito de orientar la formulación de métodos de enseñanza-aprendizaje acordes con las necesidades de los estudiantes y el currículo.

Materiales. Estudio descriptivo transversal con 179 estudiantes matriculados en el programa de Enfermería; se aplicó la escala de Honey Alonso de estilos de aprendizaje, cuestionario autoaplicado en Google drive, se calcularon medidas de frecuencia y ji cuadrado.

Resultados. El 85,4% fueron de sexo femenino, edad promedio fue 22 años (DE = 4,8), nivel educativo prevalente en los tutores fue el técnico con 27,4%. Los métodos de enseñanza empleados por los docentes en el 63,1% fue la clase magistral, la técnica que más los motiva a aprender son los análisis de casos en un 34,6%.

El estilo de aprendizaje que predominó fue el reflexivo con una media de 15 (DE = 2,5) seguido del teórico cuya media fue 14 (DE = 2,7), la media en el teórico y el pragmático es de 11 y 12,6 con DE = 2,7 respectivamente.

Los resultados no mostraron asociación estadística significativa entre el estilo de aprendizaje y los factores personales y educativos indagados.

EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA: UNA EXPERIENCIA EN EL CONTEXTO DE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA

Institución:

Universidad de Córdoba

Autores:

Martha Orozco Valeta y Javier Bula

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. La propuesta “Educar para la convivencia” sistematiza las experiencias de una electiva del programa de Enfermería de la Universidad de Córdoba, que apuesta por la formación de profesionales dispuestos a transformar su contexto regional y generar propuestas de cuidado para la salud y la convivencia de personas y comunidades en condición de vulnerabilidad.

Metodología. Sistematización de las experiencias, método que propone una dinámica participativa. El programa de enfermería, ha venido participando en la construcción social y en el desarrollo sostenible de la región, su enfoque comunitario y de salud familiar ha hecho posible intervenciones de cuidado con las comunidades rurales desplazadas por el conflicto armado y la violencia.

La reflexión en torno a esta situación ha permitido replantear el currículo de la enseñanza del cuidado de la Enfermería a partir del patrón de conocimiento ético, emancipatorio y político, trascendiendo a otras áreas del saber.

Resultados. El 88% de los estudiantes manifiesta que este tipo de asignatura les permite crear conciencia de la necesidad de cambio; el nivel de argumentación mejoró significativamente entre los participantes y los productos derivados de esta asignatura se han documentado en ensayos que reflejan el pensamiento crítico de los autores.

CARACTERIZACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL CUIDADO HUMANIZADO EN ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Institución:

Universidad de Santiago de Chile

Autora:

Rossana Jacqueline Navarro Torres

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. La formación del enfermero en la Universidad de Santiago de Chile busca desarrollar desempeños integrales, entre ellos entregar cuidados humanizados y de calidad, para lo cual es necesario caracterizar el aprendizaje del cuidado humanizado que obtienen los estudiantes de la carrera de Enfermería.

Objetivo. Interpretar el aprendizaje del cuidado humanizado que los estudiantes de tercer año de la carrera de Enfermería adquieren a través de la vivencia del cuidado, utilizando la filosofía de Jean Watson.

Metodología. Investigación cualitativa con los relatos de vida de los estudiantes después de realizar el cuidado de Enfermería durante su práctica clínica. En las fuentes secundarias se considera la evidencia existente en los procesos de enseñanza-aprendizaje del cuidado de Enfermería durante las experiencias clínicas de estudiantes de esta carrera en el mundo.

Los criterios de selección del grupo de estudio consistirán en que estos sean estudiantes que cursen el tercer año de Enfermería en la Universidad de Santiago de Chile, que hayan realizado al menos dos años y medio de formación, con al menos dos experiencias clínicas y hayan terminado su experiencia clínica de Enfermería del adulto, además de la aprobación del consentimiento informado.

Los relatos de vida de los estudiantes se contrastarán con el proceso “caritas” de la teoría de Jean Watson.

CATEGORÍA: CUIDADOS PALIATIVOS

CALIDAD DE VIDA Y SOPORTE SOCIAL EN LOS CUIDADORES FAMILIARES DE PERSONAS CON CÁNCER EN TRATAMIENTO PALIATIVO

Institución:

Universidad Nacional. Hospital Universitario de Santander

Autor:

Henry Mauricio Puerto Pedraza

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. El cáncer tiene un impacto físico, social, emocional y económico en la vida de quien lo padece, al igual que su cuidador. El rol que asume el cuidador de personas con cáncer en tratamiento paliativo afecta su calidad de vida y soporte social con el que cuenta.

Objetivo. Determinar la relación entre calidad de vida y soporte social en los cuidadores familiares de personas con cáncer en tratamiento paliativo.

Metodología. Estudio de corte transversal, con 30 cuidadores familiares que asistieron a la Unidad de Oncología y Radioterapia del Hospital Universitario de Santander. Se utilizaron los instrumentos “Calidad de vida versión familiar” y “Soporte social percibido en enfermedad crónica”. El análisis se realizó por estadística descriptiva e inferencial: prueba Shapiro Wilk, coeficiente de correlación de Pearson y estratificación de Dalenius y Hodges.

Resultados. Los cuidadores familiares son mujeres de estrato económico 1 y 2, nivel educación media, ocupación hogar, con un promedio de 16,6 horas día de cuidado. Se identificó una correlación positiva y fuerte $r = 0,69$ y un valor de $p = 0,000$ estadísticamente significativo.

Conclusión. Se requiere abordar el soporte social en los cuidadores familiares de personas con cáncer en tratamiento paliativo para fortalecer su calidad de vida.

NIVEL DE FUNCIONALIDAD DE FAMILIAS CON UN INTEGRANTE CON ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRANSMISIBLE AVANZADA

Instituciones:

Universidad El Bosque, Fundación Cardioinfantil-IC Bogotá D. C.

Autoras:

Ruth Valle y Adriana Torres

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. La falla cardíaca es una enfermedad crónica no transmisible (ECNT) con un gran auge en el mundo, caracterizada por síntomas que con el tiempo se agudizan comprometiendo la capacidad funcional del enfermo, y en consecuencia el nivel de funcionalidad de su familia.

Objetivo. Describir los factores asociados con el nivel de funcionalidad de familias con un integrante con falla cardíaca avanzada de una IPS de Bogotá.

Materiales y métodos. Estudio cuantitativo, descriptivo y transversal realizado entre septiembre y octubre de 2016 en la Fundación Cardioinfantil I.C., institución de tercer nivel especializada en el manejo de estos pacientes. La población fue de 50 familias. Para la investigación se identificó, a partir de la Escala de New York, la clase funcional que presentaba el integrante familiar enfermo, y su grado de dependencia aplicando el índice de Barthel.

Resultados. El mayor porcentaje de los factores sociodemográfico y familiar no estaban asociados con el nivel de funcionalidad de las familias que, según el modelo teórico de Organización Sistemática de Marie Luise Friedemann, fue bajo.

CUIDADOS PALIATIVOS DE ENFERMERÍA PARA EL MANEJO DEL DOLOR DEL PACIENTE EN HEMODIÁLISIS

Institución:

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

Autores:

Sandra Milena Hernández Zambrano, Alejandro Duque Pineda y Johana Beatriz Galindo Infante

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. El dolor es uno de los principales síntomas que afecta la calidad de vida de los pacientes sometidos a hemodiálisis y que interfiere con su capacidad funcional y de interactuar socialmente; aumenta la depresión y la ansiedad y genera trastornos del sueño. Cabe entonces preguntarse: ¿qué describe la literatura sobre los cuidados paliativos de Enfermería para el manejo del dolor del paciente en hemodiálisis?

Metodología. Se realizó una revisión integradora de la literatura. Se incluyeron artículos de investigación primaria y revisiones publicados en español, inglés y portugués durante el periodo 2006-2017.

Resultados. Se seleccionaron nueve estudios. Los resultados se organizaron en cinco categorías: (1) experiencia dolorosa, (2) valoración de la experiencia dolorosa, (3) factores que aumentan y disminuyen la tolerancia al dolor, (4) tratamientos no farmacológicos para el manejo del dolor y (5) factores que interfieren en los cuidados de Enfermería para el alivio del dolor.

Conclusiones. El personal de Enfermería no tiene claras las pautas analgésicas y no farmacológicas para el manejo del dolor. La participación del paciente en la toma de decisiones y la comunicación efectiva influyen en el alivio del dolor. Las medidas no farmacológicas como la musicoterapia, reflexología y la técnica de Benson demuestran disminución del dolor.

CATEGORÍA: SALUD PÚBLICA

COMPORTAMIENTOS SALUDABLES EN UNA COMUNIDAD

Institución:

Universidad Santiago de Cali

Autoras:

Sonia Quebradas Jiménez, Estela Rodríguez Torres y María Mercedes Burgos

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Las intervenciones en salud a las comunidades en el comportamiento saludable y el autocuidado requieren ser vistas desde la perspectiva del empoderamiento y mejoramiento de la salud con respecto a la actividad física, nutrición y responsabilidad en salud entendida como la adherencia a los programas de promoción y prevención en salud según la normatividad vigente.

Materiales y métodos. Se realiza un estudio probabilístico descriptivo comparativo en dos poblaciones vulnerables, una intervenida con actividades de atención primaria en salud y otra libre de ellas, en Cali, con 385 participantes de la Empresa Social del Estado Norte.

Resultados. De un 8,2% de no asegurados en salud, el 51% no indaga por sus derechos en salud, los adultos mayores en un 60% asignan más tiempo al mantenimiento de su salud, la asistencia a los controles para evitar la enfermedad es del 83,2% a partir de los 42 años de edad. Entre quienes realizan y no hacen actividad física presentan una $p < 0,002$, no se encuentran diferencias con nutrición y responsabilidad en salud, solo el 58% cuenta con los recursos económicos para cuidar de su salud.

Conclusiones. Deben ser fortalecidas las intervenciones de Enfermería en salud comunitaria para mejorar el autocuidado.

PRÁCTICAS Y SENTIDOS EN EL USO DEL PRESERVATIVO EN JÓVENES UNIVERSITARIOS DE CALI

Institución:

Universidad del Valle

Autoras:

Claudia Patricia Valencia, Teresita Sevilla, Gladys Eugenia Canaval y Linda Teresa Orcasita

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Identificar la frecuencia del uso del preservativo y el sentido que los jóvenes le otorgan a la vivencia de la sexualidad y a las prácticas preventivas.

Materiales y métodos. Estudio mixto, diseño secuencial explicativo, con un componente cuantitativo de corte transversal y uno cualitativo de corte narrativo. La muestra fue de 1704 jóvenes entre 18 y 24 años de tres universidades de Cali. La muestra del componente cualitativo fue de 30 jóvenes y la triangulación se realizó mediante el proceso de integración para hacer metainferencias.

Resultados. La proporción de jóvenes que utilizan “siempre” el condón en sus encuentros sexuales fue del 32%. Los hombres lo usan “siempre” en mayor proporción (36%) que las mujeres (27%) ($p: 0,000$). Entre la población no heterosexual su uso es menor (23%) que entre los heterosexuales (32%), excepto en la última relación sexual.

Conclusiones. Entre las mujeres, la estabilidad de la relación y la confianza en la pareja aleja el temor a las ITS y la prioridad es el embarazo. La mayor proporción de uso del condón en la última relación sexual en los jóvenes con orientación no heterosexual evidencia un gran interés por experimentar. Los significados alrededor de la sexualidad explican las prácticas y orientan el cuidado.

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON NEFRITIS LÚPICA CON EDADES ENTRE 18 Y 55 AÑOS, DE LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA

Institución:

Universidad Simón Bolívar

Autora:

Gladys Gregoria Gaviria García

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Las enfermedades crónicas dificultan el desarrollo financiero y reducen el potencial del progreso de países con rápido crecimiento económico; las enfermedades crónicas presentan factores de riesgos habituales y modificables como alimentación sana, inactividad física y consumo de tabaco, factores de riesgo que en su mayoría causan muertes.

Por ello se deben considerar otros factores que ayuden a minimizar riesgos de complicaciones y muerte, como la adherencia al tratamiento, lo que hace necesario un seguimiento sistémico que incluye desde tomar parte en el programa de tratamiento y continuarlo, hasta desarrollar conductas de salud, acudir a citas con profesionales de la salud y realizar adecuadamente el régimen terapéutico. La adherencia del tratamiento en pacientes con nefritis lúpica es importante para evitar complicaciones y riesgos de muerte.

Objetivos. Comprobar la adherencia al tratamiento integral en pacientes con nefritis lúpica con edades entre 18 y 55 años, del Caribe colombiano.

Materiales y métodos. Estudio aplicativo de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte transversal.

Resultados. El estudio permitió identificar aspectos relevantes que tributan aspectos para una adecuada adherencia al tratamiento integral en pacientes con nefritis lúpica de la región Caribe colombiana.

¿QUÉ ESPERAN LOS PADRES O CUIDADORES DE LA RED DE APOYO FRENTE A LA SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL DE UN HIJO?

Institución:

Universidad de São Paulo, Brasil

Autora:

Carolina Gutiérrez López

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Describir la importancia del padre o cuidador ante la situación de abuso sexual de un hijo.

Materiales y métodos. Estudio descriptivo, de corte transversal, con abordaje metodológico cualitativo y cuantitativo del “Discurso del sujeto Colectivo-DSC”. Entrevista realizada a 60 padres o cuidadores primarios no perpetradores, de los municipios de Cajicá y Tabio (Cundinamarca). Los datos empíricos fueron abordados con el uso del Discurso del Sujeto Colectivo (DSC), fundamentado en la teoría de las representaciones sociales, que viabiliza el conocimiento semántico de una población. El procesamiento y el análisis cuantitativo fueron realizados con el software Qualiquantisoft, propio del método del DSC.

Resultados. El discurso de mayor significancia por los entrevistados fue la relación entre los padres o cuidadores y el hijo (45,74% n = 43); enfatizan en mejorar el rol como padres, mediante la confianza, el diálogo, el tiempo y el cuidado a los hijos; así mismo consideran importante el papel que juega la red de apoyo en la protección y justicia (29% n = 32).

Conclusión. La credibilidad, los comportamientos y las medidas de protección que los padres o cuidadores primarios asumen son directrices esenciales para el proceso de la revelación del abuso sexual y un medio que favorece la elaboración positiva de la experiencia traumática del niño. Cabe resaltar que el rol que desempeñan los profesionales que intervienen en estos casos es muy importante porque con su actitud, apoyo y gestión es posible un cuidado integral para disminuir las consecuencias de largo plazo.

CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL RESGUARDO INDÍGENA TAMA-PÁEZ LA GABRIELA. NEIVA, 2017

Institución:

Universidad Surcolombiana

Autores:

Juan Camilo Calderón Farfán, María Paula Quintero Tamayo y Martha Nidia Papamija Gómez

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. En el mundo las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades indígenas resultan desfavorables según indicadores comparativos con población no indígena. Este es un tema de interés para el resguardo indígena Tama-Páez La Gabriela, comunidad cercana al municipio de Neiva.

Objetivo. Explorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de los comuneros del resguardo.

Metodología. Estudio de tipo cualitativo de alcance exploratorio, que aplicó las técnicas de foto-voz y grupos de discusión, y procesó la información mediante análisis de contenido.

Resultados. Se obtuvieron tres categorías: territorio, ritualidad e intrusión del modernismo. Se evidencian condiciones de vulnerabilidad del derecho a la alimentación en el territorio, asociadas con modificación de los procesos de producción de alimentos e irrupción de prácticas externas que agreden a la madre Tierra. Se destacan acciones de resistencia como las luchas por la defensa del territorio, prácticas alimentarias ancestrales y perspectivas propias frente al significado de la nutrición visto desde su cosmovisión, que se dirigen a la conservación de su identidad como pueblos indígenas.

Conclusión. Se destaca la necesidad de fortalecer estrategias de adecuación intercultural de políticas y programas en materia alimentaria para la pervivencia social y cultural de estos pueblos.

FACTORES QUE AFECTAN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE TRES INSTITUCIONES DE SALUD

Institución:

Universidad Metropolitana

Autoras:

Janeth Jinete Acendra, Damar Barraza Ospino, Alba Pardo Vásquez y Rosa Morales Aguilar

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. La seguridad del paciente se define como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias que minimizan el riesgo de sufrir un evento adverso (EA) o mitigar sus consecuencias. En la actualidad existe una marcada preocupación por los factores relacionados con la ocurrencia de estos EA, características intrínsecas de pacientes, extrínsecas y del sistema, que generan fatiga y deterioro del rendimiento humano, incluyendo errores de omisión, los cuales conllevan necesariamente a la presentación de estos eventos.

Objetivo. Determinar los factores que afectan la seguridad del paciente en unidades de cuidados intensivos de tres IPS de Barranquilla para disminuir así la ocurrencia de eventos adversos.

Metodología. El estudio fue de tipo descriptivo, transversal. La población en estudio estuvo conformada por 27 enfermeras, 64 auxiliares de Enfermería y 134 pacientes que ingresaron durante el periodo de estudio en las tres unidades de cuidados intensivos. Los Instrumentos utilizados fueron: lista de chequeo de procesos seguros, TISS 28, Apache II y cuestionario de seguridad del paciente. *Resultados.* El 35% de la población atendida (pacientes) se encontraba en el curso de vida de mayores de 44 años y la mortalidad asociada fue del 40% en una gran parte de la población. La población observada se adhiere a los protocolos de atención. Sin embargo el 76% no tiene claro que es un EA, el 63% no conoce los objetivos de la seguri-

dad del paciente y un 52% presenta dificultades en definir que es un evento centinela.

El personal de Enfermería señala que existen actividades institucionales dirigidas a mejorar la seguridad del paciente. Sin embargo, de acuerdo con la escala TISS-28 existe sobrecarga laboral. De igual forma el personal de Enfermería señaló que se les asignan demasiados pacientes para su atención y no hay suficiente personal para afrontar la carga de trabajo, por lo que en ocasiones no se puede proporcionar la mejor atención al paciente porque la jornada laboral es agotadora.

Resultados. Catorce departamentos se ubicaron en la categoría de <5%, cuatro entre 5% a 19%, siete entre 20% a 50% y seis con >50%. Se observa que el promedio de la razón de tasas de mortalidad infantil es mayor en el grupo con más municipios afectados, lo que indica cierta correlación entre la reducción del conflicto y las mejoras en salud.

El departamento más favorecido con el desescalamiento de los enfrentamientos ha sido Arauca (RTMI = 5,6; RTMM = 7,5).

EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO Y LOS RESULTADOS EN MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL

Institución:

Universidad de Cartagena

Autores:

Irma Yolanda Castillo Ávila, Luis Reinaldo Alvis Estrada y Diana Marcela Herrera Galvis

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Establecer la correlación entre el desescalamiento del conflicto armado en Colombia y los indicadores sanitarios, como las tasas de mortalidad infantil y materna.

Metodología. Estudio exploratorio. Los departamentos de Colombia fueron clasificados en cuatro grupos según presencia de las Farc. Para ello se tuvo en cuenta el porcentaje de municipios del departamento que sufrieron atentados de este grupo armado. Las categorías fueron: <5%, 5% a 19%, 20% a 50% y >50%. Los indicadores sanitarios fueron obtenidos de los Indicadores Básicos en Salud 2000-2015.

Se estimaron tanto las razones de las tasas de mortalidad infantil y materna como las diferencias entre estas durante el primer y el último año del periodo de estudio.

COMPARACIÓN DE LAS ACTITUDES HACIA LA SEXUALIDAD EN LA VEJEZ. CARTAGENA, 2015

Institución:

Universidad de Cartagena

Autoras:

Estela Melguizo Herrera, Ana Acosta López e Imelda Orozco Mares

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida; abarca el sexo, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual y las identidades y los papeles de género.

Objetivo. Comparar las actitudes hacia la sexualidad en la vejez; entre adolescentes; adultos, y adultos mayores (AM), en Cartagena, Colombia, 2015.

Metodología. Estudio descriptivo, con poblaciones de jóvenes, adultos y adultos mayores de Cartagena, en 2015. Se seleccionó al azar una muestra de 1663 personas: 666 jóvenes, 365 adultos y 632 personas mayores. Se aplicó el cuestionario "Actitudes hacia la sexualidad en la vejez", se empleó estadística descriptiva y se consideraron los aspectos éticos.

Resultados. El promedio de edad fue de 17 años para los jóvenes, 46 años para los adultos y de 71 para los adultos mayores. El 84,4% de los jóvenes,

el 80,2% de los adultos y el 76,1% de los adultos mayores consideraron que los AM tienen derecho al amor y a la vida sexual.

Conclusiones. En general las tres poblaciones evidenciaron actitudes poco prejuiciosas, es decir positivas, hacia la sexualidad en la vejez, aunque con el avance de la edad se observan actitudes cada vez más prejuiciosas.

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN JÓVENES DE UNA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA. PEREIRA, 2016

Institución:

Fundación Universitaria del Área Andina

Autora:

María Nelcy Muñoz Astudillo

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) es una problemática biopsicológica y un fenómeno relacional de gran complejidad. Los jóvenes son la población de mayor riesgo epidemiológico global; en Colombia el consumo en universitarios es cinco veces mayor que en la población general.

Objetivo. Identificar la magnitud del consumo de SPA en estudiantes de una institución universitaria de Pereira en 2016.

Metodología. Estudio descriptivo transversal. Población = 5300 estudiantes. Previa sensibilización general y codificación de los correos estudiantiles, se aplicó una encuesta para universitarios, vía on line desde la plataforma de la CICAD/OEA, a los correos seleccionados aleatoriamente. NC = 95% y error de precisión 5%. Participaron voluntariamente 342 estudiantes.

Resultados. Consumo reciente de alcohol 84,8%, tabaco 27,8%, marihuana 17,6%, solventes 4,8%, cocaína 3%, éxtasis 3% y LSD 2,4%. Consumo

emergente de anfetaminas 1,2% y heroína 1%. El consumo de SPA ilícitas inicia a los 18 años (edad universitaria). Consumo problemático: 33%. Comparado con estudio de 2009 hay un marcado incremento en consumo de sustancias ilícitas.

Conclusiones. Consumo de gran magnitud y progresión, similar a los hallazgos de otras universidades. Los costos sociales/familiares y sus múltiples formas de expansión obligan a intervenciones prioritarias de Enfermería en prevención y reducción del daño.

EPIDEMIOLOGÍA DE LESIONES DE PIEL EN COLOMBIA

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Autores:

Renata Virginia González Consuegra, Wilmar José López Zuluaga y Karen Tatiana Roa Lizcano

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. De acuerdo con “Sipiela Colombia 2015”, las lesiones de piel relacionadas con el cuidado (LPRC) representan un importante problema de salud pública por los impactos negativos en salud, economía, dimensiones física, social y psicológica de las personas que las padecen y sus cuidadores; también genera importantes cargas económicas y de trabajo en el equipo de salud

Objetivo. Establecer y caracterizar la prevalencia de LPRC en Colombia en 2016.

Metodología. Estudio descriptivo transversal de prevalencia de periodo con participación de enfermeras de Colombia. Se obtuvieron 310 encuestas diligenciadas mediante plataforma on line entre octubre y diciembre de 2016.

Resultados. Se obtuvieron registros de 46 instituciones del país. Los datos provienen de 11 departamentos (29% del territorio nacional). Prevalencia para LPRC (UPP, MARSÍ, DAI, Skin Tears) y de etiología metabólica (UV y UA).

Conclusiones. Como ruta estratégica en la identificación, creación e implementación de medidas que impacten en su aparición, es pertinente realizar estudios que evidencien la situación con el fin de impactar en políticas institucionales, locales y nacionales que abarquen calidad de la atención, seguridad del paciente y salud pública.

CUMPLIMIENTO DEL LAVADO DE MANOS EN PERSONAL DE SALUD EN CUIDADOS INTENSIVOS BARRANQUILLA, 2016

Institución:

Universidad Simón Bolívar

Autora:

Julieth Michell Vélez Ortega

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. El lavado de manos es una herramienta simple que tienen los profesionales de la salud como práctica hacia el enfoque preventivo de adquirir una infección asociada con el cuidado de la salud.

Metodología. Estudio descriptivo, observacional, prospectivo, de tipo sombra, para evaluar el cumplimiento del lavado de manos en el personal de salud que labora en las UCI de una clínica de Barranquilla.

Resultados. Se identificaron los factores asociados con el cumplimiento del lavado de manos por el personal de salud. El tipo de contacto en ambas UCI predominó al AC (antes del contacto con el paciente con un 37% en la UCIA, y 57% en la UCIP). El alcohol glicerinado 70% en la UCIA, clorhexidina 80% en la UCIP.

Discusión y conclusión. Es importante retrocalificar la guía de prevención de infecciones como herramienta preconizada cuando hay suciedad, contaminación por fluidos y sangre. La OMS y Unicef (2008) declararon el 15 octubre como “Día de las manos limpias”, lo que contribuyó aumentar el cumplimiento a gran escala. Se verificó la técnica

utilizada según la OMS. Se identificaron los factores asociados con el cumplimiento del lavado de manos en el personal de salud según las variables.

SISTEMA DE CREENCIAS EN RELACIÓN CON EL USO Y LAS CONSECUENCIAS DEL CANNABIS: CONSUMIDORES VS. NO CONSUMIDORES EN UNA UNIVERSIDAD DE COLOMBIA

Institución:

Universidad de Córdoba

Autores:

Álvaro Sánchez Caraballo, Gonzalo Galván Patrignani, Ilena Gómez Morales y Óscar Humánez Julio

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. El consumo de sustancias psicoactivas se reconoce como un problema de salud pública; el cannabis continúa siendo la sustancia ilegal más consumida en el mundo.

Las ideas preconcebidas y las creencias que se tienen con respecto al uso de cannabis impactan en la percepción del riesgo que influye directamente en la conducta de consumo o no consumo.

La investigación determinó las diferencias del sistema de creencias en relación con el uso y las consecuencias del cannabis entre un grupo de consumidores y otro de no consumidores del nivel educativo universitario; asimismo estableció el grado de abuso, dependencia y problemas asociados con el consumo de cannabis.

Metodología. Estudio descriptivo y transversal con enfoque cuantitativo, realizado a 70 estudiantes clasificados en dos grupos: 35 consumidores habituales de cannabis y 35 que nunca lo han consumido, equiparados por sexo y edad.

Conclusiones. Quienes consumen cannabis tienen un sistema de creencias constituido en su mayoría por creencias propiamente dichas (46%), y en quienes no consumen predominan las con-

vicciones (37%). Los consumidores de cannabis tienen baja percepción del riesgo de la sustancia con respecto al grupo control y presentan problemas familiares, sociales y personales asociados con el consumo.

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE MONTELUKAST MÁS ANTIHISTAMÍNICOS ORALES PARA LA RINITIS ALÉRGICA. REVISIÓN SISTEMÁTICA

Instituciones:

Universidad del Rosario y Universidad CES

Autores:

Karla Jimena Ortiz Lozano, Luis Guillermo Jiménez Villa, Sandra Marcela Castellanos y Carlos Federico Molina

Modalidad:

Póster

Resumen:

Objetivo. Determinar la eficacia del tratamiento combinado de Montelukast con antihistamínicos orales en el tratamiento de rinitis alérgica en comparación con cada uno de estos en monoterapia o placebo.

Material y métodos. Revisión sistemática de la literatura con metaanálisis de los estudios clínicos que evaluaron la eficacia por medio del Total Nasal Symptom Score de los antihistamínicos orales y Montelukast tanto en monoterapia como en terapia combinada.

Resultados. En la búsqueda electrónica y manual se identificaron 795 artículos publicados hasta febrero de 2016, con selección final de seis artículos. Se encontró una reducción significativa del Total Nasal Symptom Score de -2,61 (-3,32 a -1,90) de la terapia combinada versus la monoterapia de cada uno de estos y el placebo.

Conclusiones. La terapia combinada de Montelukast con antihistamínico redujo significativamente el puntaje de TNSS en -2,61 (-3,32 a -1,90) por lo que es eficaz en pacientes con rinitis alérgica.

REFLEXIÓN DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA: ACUERDOS Y AVANCES DE UNA ESPERANZA DE PAZ

Institución:

Universidad Antonio Nariño

Autoras:

Hilda Mireya Miranda Rojas, Diana Milena Cossio Restrepo y Adriana Milena Paipa Suarez

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. En Colombia el conflicto armado desencadena inmemorables hechos violentos que han dejado huellas imborrables y devastadoras consecuencias que ocasionan grandes violaciones de los principios y los derechos humanos.

Objetivo. Realizar una revisión bibliográfica sobre el conflicto armado en Colombia, desde la década de los años cincuenta hasta la actualidad y el rol de la Enfermería en la formación de una cultura de paz.

Metodología. Se realizó una revisión bibliográfica de las diferentes bases de datos como Scielo, Redalyc, Pubmed, Dialnet, revistas indexadas y páginas de internet científicas, de artículos, revistas, tesis, documentos y libros español e inglés, de 2002 a 2016, en países como Brasil, Argentina, México y Colombia.

Resultados. El conflicto armado tiene más de cinco décadas, la descripción de la literatura frente al tema muestra: el impacto frente a la sociedad civil, los hechos más violentos que impactaron en la población colombiana, el rol de la Enfermería, y la educación como instrumento de paz.

Conclusión. La población civil es vulnerable a los ataques perpetuados por los grupos al margen de la ley, por ello el Gobierno crea acuerdos de paz que benefician a la población civil y a los grupos insurgentes para la reinserción social.

PREVALENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DEL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, DE VENUSTIANO CARRANZA, 2017

Institución:

Universidad Simón Bolívar

Autores:

Eva Alvares Santiz, Jhader Gerónimo Gutiérrez, Sandra Hernández Chanona y Jaqueline Jiménez Vázquez

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. La diarrea aguda es el número de deposiciones o la disminución en su consistencia, de instauración rápida; sus signos y síntomas son náuseas, vómitos, fiebre o dolor abdominal; la causa más frecuente es la infección gastrointestinal (Arped, 2017).

Objetivo. Determinar la prevalencia de enfermedad diarreica aguda en niños menores de cinco años del Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, de Venustiano Carranza.

Metodología. Estudio descriptivo, transversal, la población fue 120 estudiantes, el muestreo fue aleatorio simple. Se utilizó una encuesta que contó con 17 reactivos.

Resultados. El 29% del total de la muestra (27 niños) presentaron diarrea en las últimas cuatro semanas.

Conclusiones. A pesar de que existen políticas y programas para disminuir esta enfermedad, en el estudio se identificó una prevalencia del 29%.

Referencias: Asociación española de Pediatría (Aeped). (2017). Diarrea aguda. Recuperado de: https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/diarrea_ag.pdf

CATEGORÍA: CULTURA Y CUIDADOS

CULTURA DEL CONSUMO INFORMADO DE BEBIDAS ENERGIZANTES EN JÓVENES ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE BOGOTÁ

Institución:

Universidad El Bosque

Autoras:

Olga Stella Díaz Usme y Luisa Fernanda Franco Rubio

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. El incremento en el consumo de bebidas energizantes (BE), variedad de mezclas y posibles consecuencias en la salud, se identifica como un tema de discusión en la agenda de salud pública. La literatura señala a los jóvenes y estudiantes de instituciones de educación superior como altamente vulnerables a su consumo. Los organismos internacionales y las entidades gubernamentales de salud y educación advierten sobre la necesidad de educar acerca de las reacciones secundarias, los efectos adversos, las contraindicaciones, los factores de riesgo personales y las asociaciones peligrosas.

Objetivo. Analizar los conocimientos, actitudes, prácticas y percepciones de los jóvenes estudiantes como soporte en el diseño de una estrategia de información, educación y comunicación en salud, orientada a fortalecer la cultura del consumo informado de BE.

Metodología. Investigación mixta. Participación voluntaria. Investigación sin riesgo.

Resultados. No se identifican diferencias significativas en el consumo de BE asociadas con el sexo. El 62,1% y el 37,5% de las mujeres y los hombres respectivamente asegura conocer los componentes; el 72,3 de quienes consumen conocen las advertencias, de los cuales el 67,2% son mujeres y el

32,4% hombres. Existen diferencias significativas en el consumo por programa.

Conclusiones. Los estudiantes identifican como fuente de energía el ejercicio, el descanso, la alimentación y las bebidas como café y té.

CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE CUIDADO CULTURAL DE GESTANTES PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD INDÍGENA WAYÚU

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Autoras:

Ariadna María Angarita Navarro y Martha Patricia Bejarano Beltrán

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Conocer las creencias y prácticas de cuidado de las gestantes de la comunidad indígena Wayúu en las rancherías de Sapalou y Sotalu, para lo que es necesario conocer su contexto identificando los factores según el modelo del “sol naciente” que influyen en sus cuidados culturales en la gestación. Para realizar este estudio se hizo inmersión en el campo.

Materiales y métodos. Según los criterios de inclusión, en el estudio participaron 11 gestantes. Se prosiguió a recolectar la información mediante la observación participativa y entrevistas semiestructuradas. La muestra se obtuvo por saturación de la información; el análisis de dicha información se realizó basándose igualmente en el modelo del sol naciente propuesto por Madeleine Leininger. Para obtener la información y llevar a cabo las entrevistas fue necesario contar con la participación de una traductora perteneciente a la comunidad indígena Wayúu. Fue importante trabajar la empatía, el respeto por su cultura y la confianza para que las indígenas brindaran la información.

Resultados. Mediante la investigación se pudieron conocer sus cuidados basados en creencias y prác-

ticas culturales en las rancherías de la comunidad indígena Wayúu, tales como la abstinencia de comer ciertos animales como tortuga, camarón, caracol y conejo; cuidados de una partera de la comunidad para acomodar el hijo por nacer; no le dan de comer ni beber a personas que hayan asesinado a otras personas, y tampoco asisten a funerales.

APROXIMACIÓN A UN MODELO DE CUIDADO. MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LA SALUD HUMANA: CUIDADO DE ENFERMERÍA A PARTIR DE LOS SABERES

Institución:

Universidad del Cauca

Autoras:

Carmita Cepeda y Adriana Valdez

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Describir el desarrollo de un modelo de cuidado de Enfermería desarrollado en la alianza docencia-servicio Hospital Universitario San José de Popayán y la Universidad del Cauca, para mejorar la experiencia de la salud humana con un cuidado de Enfermería fundamentado en los diversos saberes.

Materiales y métodos. Estudio descriptivo de tipo metodológico desarrollado por fases que incluyeron capacitación, análisis de los conceptos metaparadigmáticos de Enfermería, desarrollo de supuestos del cuidado, definición de un modelo de cuidado que responde al contexto de la alianza docencia-servicio y sus indicadores de desarrollo y socialización del modelo planteado.

Resultados. Siguiendo cada uno de los pasos planteados en el Diplomado Alianza Docencia-servicio para la implementación de modelos de cuidado de Enfermería, se desarrolló el modelo “Cuidar lo humano desde los saberes” en el que se incluyen además de los conceptos metaparadigmáticos, los supuestos e indicadores de medición priorizados.

Conclusiones. El modelo “Cuidar lo humano desde los saberes” es un modelo de práctica profesional de Enfermería que responde al contexto de la alianza docencia-servicio entre la Universidad de Cauca y el Hospital Universitario San José.

en los currículos, políticas, y cuidado en sí, una perspectiva que propenda por la equidad de género y permita aportar a la construcción de una universidad y una sociedad basadas en el respeto a lo diverso, en las que cada persona pueda ser libre de elegir lo que es y quiere ser.

RELACIONES Y PRÁCTICAS DE GÉNERO EN UN GRUPO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE UNA FACULTAD DE SALUD EN CALI, COLOMBIA

Institución:

Universidad del Valle

Autoras:

Lina María Cerón Vanegas, Natalia Muñoz Solarte, Daniela Orozco Chacón, Claudia Patricia Valencia Molina y Martha Cecilia González

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Proyecto de investigación realizado por estudiantes y docentes de Enfermería de la Universidad del Valle, cuyo objetivo general fue identificar prácticas y relaciones de género en las interacciones de un grupo de estudiantes de una facultad de salud.

Metodología. Cualitativa, cuya producción de información se realizó por medio del desarrollo y análisis de cuatro grupos de discusión en los que participaron 25 estudiantes de pregrado.

Resultados. Esta investigación permitió evidenciar la vigencia de una perspectiva de género patriarcal que se manifiesta por medio de nuevas formas en las relaciones y prácticas, “Es que una sabe que un cambio no va a ocurrir tan rápido, entonces (...) evita hacer cosas para no estar en peligro”; aunque el tránsito por el medio universitario contribuye a la deconstrucción de esta, se requieren esfuerzos adicionales que lleguen a una mayor población y tengan impacto en la sociedad, por lo tanto se resalta la necesidad de transversalizar

PROCESO SALUD-ENFERMEDAD QUE TIENEN LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA GRAN TESCUAL, PUERRES, NARIÑO

Institución:

Universidad Mariana de Pasto

Autoras:

Jenny Lorena Erazo Jojoa y Nohora Ortega

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Reconocer la diversidad cultural de los pueblos permite orientar adecuadamente los cuidados y políticas a poblaciones indígenas, mediante las cuales se fortalezca su reconocimiento cultural y ancestral ante procesos generados por los cambios sociales, económicos y políticos que se dan en el marco del tratado de paz que actualmente se desarrolla en el país.

El proyecto social “proceso salud-enfermedad” que tienen los integrantes de la comunidad indígena Gran Tescual del municipio de Puerres, realizado conjuntamente con la Alcaldía Municipal y direccionado por la Unidad Académica de Proyección Social, permitió identificar los significados del proceso salud-enfermedad y medicina ancestral, apoyándose en la metodología cualitativa y etnográfica, a partir de la teoría de Leininger, que permitió identificar la cosmovisión del pueblo indígena, su relación con la madre tierra y la relación salud-enfermedad, logrando la construcción conjunta de la propuesta intercultural de las prácticas claves del AIEPI comunitario que da respuesta a la necesidad del cuidado de los niños.

EFFECTO DE UN PROGRAMA DE CUIDADO CULTURAL EN EL APOYO SOCIAL DE ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD, FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA

Institución:

Universidad Nacional de Colombia.

Autoras:

Nathalya Casallas Hernández y Vilma Florisa Velásquez Gutiérrez

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Debido a los cambios epidemiológicos, económicos y sociales, la población adulto mayor ha aumentado considerablemente, junto con la carga de morbilidad por enfermedades crónicas no transmisibles y procesos salud-enfermedad que traen consigo situación de discapacidad. Por lo tanto, como profesionales de Enfermería, debemos brindar un cuidado integral en el que se tenga en cuenta el apoyo social.

Objetivo. Describir el efecto de un programa de cuidado cultural en el apoyo social global y por dimensiones en adultos mayores con discapacidad en Facatativá, Cundinamarca.

Metodología. Cuantitativa de tipo cuasi-experimental, sin grupo control, con preprueba y posprueba. Muestra intencional 31 adultos mayores con discapacidad. El programa culturalmente congruente fue aplicado por la enfermera investigadora y otra enfermera previamente entrenadas. Información recolectada con cuestionario MOS-Apoyo social, procesado y analizado con métodos descriptivos y prueba de rango signado de Wilcoxon. Consideró aspectos éticos.

Resultados. El programa logró un efecto estadísticamente significativo de apoyo social global y por dimensiones en los adultos mayores con discapacidad (Valor-p < 0,001).

Conclusiones. Se rescata a la familia como fuente principal de apoyo social, se reconoce su utilidad en la minimización de agobio, la adaptación a su nuevo rol y el fortalecimiento de la autonomía.

PRÁCTICAS DEL PERSONAL DE SALUD Y LAS MUJERES DURANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO: LA INTEGRALIDAD Y LA HUMANIZACIÓN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE BOGOTÁ - LOCALIDAD DE USAQUÉN

Institución:

Universidad El Bosque

Autores:

Alejandro Perdomo Rubio, Diana Carolina Rubio, Andrés Cañón, María Mercedes Lafaurie y Pablo Martínez

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. El fenómeno de la Violencia Obstétrica (VO) es un problema emergente y en construcción, en el que diversas comunidades científicas de mujeres y estatales se disputan acerca de cómo entenderla y cómo abordarla.

Objetivo. Aproximarse a esta construcción en cinco países de América Latina.

Metodología. Mediante una revisión de documentos científicos, periodísticos y audiovisuales se intenta identificar sus principales características, sus convergencias y los nudos de tensión.

Resultados. Reconoce las diferencias de perspectivas entre las comunidades, entre quienes definen un rol pasivo o activo de los profesionales, las mujeres o el sistema de salud. Además se reconoce que algunas comunidades tienen mayor legitimidad que otras en cada uno de los países, lo que se expresa en los medios de divulgación y el establecimiento de su punto de vista tanto en el marco normativo como en la definición de estrategias de acción.

Conclusiones y recomendaciones. Se recomienda un empoderamiento de las organizaciones de mujeres y la creación de diálogos de calidad entre las diferentes comunidades para abordar un tema de por sí complejo.

SIGNIFICADO DE LAS VIVENCIAS DE LOS PACIENTES ADULTOS QUE FUERON SOMETIDOS A CIRUGÍA BARIÁTRICA EN LA CLÍNICA SAN JOSÉ ENTRE 2009 Y 2012

Institución:

Universidad Francisco de Paula Santander

Autoras:

María del Mar Ovalle Montes, Paula Andrea Vargas, Tania Castellanos, Andrea de la Rosa Martínez y María Mercedes Ramírez Ordoñez

Modalidad:

Póster

Resumen:

Objetivo. Comprender el significado de las vivencias de los pacientes adultos que fueron sometidos a cirugía bariátrica.

Materiales y métodos. Estudio cualitativo fenomenológico realizado con ocho informantes, los cuales eran pacientes operados en la clínica San José y seleccionados con un muestreo en bola de nieve. El análisis se realizó de la lectura de las entrevistas, lo que permitió la codificación de la información, agrupada en categorías y subcategorías.

Resultados. La cirugía bariátrica se presenta como una solución para aquellas personas con obesidad mórbida que no logran manejar su estado de salud con el cambio en el estilo de vida. Cuando se realiza este procedimiento surgen nuevos hábitos que generan en ellos cambios en la percepción de la salud y cambios emocionales; a la vez esta adopción de hábitos influye en aspectos de la imagen corporal, la cual favorece sus vínculos sociales.

Conclusiones. En los pacientes surgen cambios que son afrontados según la percepción de cada persona. Entre estos se destacan: cambios a nivel emocional, alimenticio, social, físico y fisiológico; además, actualmente experimentan sentimientos que no vivían antes de la cirugía, como arrepentimiento, frustración, miedo y felicidad. Por último, la persona que baja de peso adquiere conductas y comportamientos que se traducen en grandes satisfacciones como el aumento de la autoestima, la confianza en sí mismo y mejor calidad de vida.

MAPA DE LA INVESTIGACIÓN IBEROAMERICANA: RECURSOS, ESTRATEGIAS Y LIMITACIONES

Instituciones:

Universidad de Alicante, Universidad de la Rioja y Universidad El Bosque

Autores:

Pablo del Pozo Herce, Ana Lucía Noreña Peña, Miguel Antonio Sánchez Cárdenas y Jorge Mínguez Arias

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. En los últimos años la generación de conocimiento se ha incrementado con el objetivo de mejorar el cuidado e impulsar una proyección profesional más allá de sus competencias. Los indicadores de la producción científica en ISI Web of Knowledge, SCImago Journal & Country Rank concluyen que existe baja visibilidad e impacto del conocimiento producido en Enfermería. *Objetivo.* Analizar la evidencia disponible en Iberoamerica sobre las estrategias, los recursos y las limitaciones de los investigadores para producir investigación.

Metodología. Revisión bibliográfica de la evidencia científica consultando las bases de datos PubMed, Scielo, Cuiden, Lilacs, Cinahl y rastreo manual entre los artículos seleccionados. Criterios de inclusión: artículos originales, revisiones bibliográficas, estudios bibliométricos disponibles a texto completo en inglés, español y portugués, publicados entre 2010 y 2016 en países iberoamericanos.

Resultados. La actividad investigadora exige mayor formación, experiencia, motivación e integración de los estudiantes y profesionales, además de un mayor grado de confianza de los enfermeros frente a sus propias habilidades y competencias.

Conclusiones. Las publicaciones en revistas de alto impacto científico son necesarias para el avance de la disciplina y el desarrollo del conocimiento en pregrado y posgrado, pero siguen siendo escasas debido a las dificultades y barreras que limitan la investigación.

CATEGORÍA: MODELOS Y TEORÍAS DE ENFERMERÍA

CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DEL DOLOR DE LA GESTANTE SORDA, MEDIADA POR TIC

Institución:

Universidad Manuela Beltrán

Autores:

María Inés Mantilla Pastrana, Yaneth Patricia Caviativa Castro y Yoan Manuel Guzmán

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. El 24% de las personas sordas no están aseguradas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo que resulta excluyente; suelen enfrentarse a barreras para acceder a la información y no existen programas de educación en salud específicos para personas sordas, como en los servicios a los que no pueden ingresar los traductores, como por ejemplo las salas de parto.

Objetivo. Diseñar un objeto digital de aprendizaje (ODA) para el cuidado de Enfermería en el manejo del dolor de la gestante sorda.

Materiales y métodos. Estudio con dos fases: (1) revisión narrativa, en el que se seleccionaron 55 documentos de literatura científica y se analizó por categorías y subcategorías temáticas a partir de la intervención con teorías de Enfermería para dicha población y contexto; tales necesidades identificadas se convirtieron en los ejes estructurales de la segunda fase; (2) diseño de la herramienta tecnológica, basado en el Aprendizaje de Gagné y el diseño instruccional ADDIE.

Resultado. Diseño de un ODA con dos módulos: (1) cuidado de Enfermería en el manejo del dolor de la gestante sorda, (2) aprendizaje de Lengua de Señas Colombiana en salud.

Conclusión. Los ODA favorecen la comunicación terapéutica con la población sorda; son herramientas de enseñanza interdisciplinarias e indicadores empíricos para el cuidado profesional de Enfermería.

COMPROMISO Y TONO HUMANO EN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA: UN MODELO FUNCIONAL

Institución:

Clínica Universidad de La Sabana

Autoras:

Ligia Patricia Arroyo Marlés, Maryory Guevara Lozano, Beatriz Pérez Giraldo y Clara Beatriz Sánchez Herrera

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Para la Clínica Universidad de La Sabana, la práctica de Enfermería debe tener una orientación teórica para el mejoramiento permanente de su quehacer profesional.

Objetivo. Desarrollar un modelo funcional de Enfermería para la Clínica Universidad de La Sabana. Metodología. Estudio descriptivo de tipo metodológico, que con la identificación de las necesidades y evidencia disponible planteó y validó un modelo funcional de cuidado de Enfermería.

Resultados. La decisión de aplicar el modelo conceptual de adaptación propuesto por Callista Roy hizo evidente la necesidad de contar con un modelo funcional que lo acerque a la práctica y haga visible la vocación de servicio, el conocimiento y el liderazgo de la Enfermería.

Conclusión. El modelo funcional de Enfermería de la Universidad de La Sabana “Compromiso y tono humano” expresa un consenso alrededor de lo esencial de la práctica que busca apoyar el proceso adaptativo para llevar al bienestar integral y consecuente crecimiento del sujeto de cuidado. Este modelo es una expresión del compromiso de la Enfermería con la Institución y con la razón de ser de la profesión.

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO AL INGRESO DEL PACIENTE POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. EMERGENCIA. HOSPITAL DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE, 2016-2017

Institución:

Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde

Autoras:

Tiffany Zamora Zambrano, Jessica Pesantes Salazar, Silvia Villagómez Vera, Ivonne Yaguarema Pincay y Fátima Morán Sánchez

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. El profesional de Enfermería cumple diferentes funciones; una primordial es su participación al ingreso del paciente, lo que ayudará a mantener una integración enfermera, paciente y familia para recuperar su bienestar biopsicosocial.

Objetivo. Identificar la aplicación del procedimiento al ingreso del paciente por el profesional de Enfermería en el área de Emergencia. Este se fundamenta en el modelo de Virginia Henderson que refiere cuidados básicos de Enfermería apoyándose en la fisiología y psicología; la teoría del cuidado humano de Jean Watson, quien estudia las humanidades, expande la mente e incrementa la capacidad de pensar y el desarrollo personal; el modelo de los procesos vitales de Martha Rogers, cuyo objetivo es procurar y promover una interacción armoniosa entre el hombre y su entorno.

Metodología. Cualitativo-cuantitativo, inductivo-deductivo, descriptivo, transversal, prospectivo y comparativo. El instrumento y la técnica obtención de datos son encuesta, observación participativa y grupo focal.

Resultados. Según la encuesta, el 100% se lava las manos; verifica la identificación del paciente; se presenta; promueve la interacción enfermera o paciente-familiar; informa al paciente o al familiar sobre sus derechos y deberes; y capacita al personal de Enfermería.

CATEGORÍA: CUIDADO A LA MUJER

SOBRECARGA GENERADA POR EL ROL EN CUIDADORES DE PERSONAS CON ALTERACIONES COGNOSCITIVAS QUE CONSULTAN A UNA CLÍNICA DE MEMORIA

Institución:

Universidad de Caldas

Autora:

Guadalupe María Henao

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Establecer la frecuencia de cansancio del rol en cuidadores de personas con alteraciones cognitivas que consultan a una clínica especializada.

Diseño. Estudio cuantitativo, transversal, descriptivo.

Metodología. Se aplicó la escala de Zarit de 22 ítems, validada para Colombia a 138 cuidadores de personas que asisten como acompañantes a consulta de una clínica de memoria entre 2014 y 2017.

Resultados. Edad promedio 55,7 años (DE: 14,2). 84,8% (n: 117) son mujeres. Formación: años promedio aprobados 11,4 (DE: 4,39). Cuidadores principales 90,6% (n: 125). Se detectó sobrecarga en 57,2% (n: 79) de los cuidadores evaluados, siendo intensa en 44,2% (n: 61). Los aspectos que más puntúan en la carga y sobrecarga están dados porque: tiene miedo por el futuro del familiar: 46,4% (n: 64); piensa que su familiar depende de usted: 57,2% (n: 79); piensa que su familiar lo considera a usted la única persona que lo puede cuidar: 42,8% (n: 59).

Discusión. En concordancia con estudios similares, la edad, el género y los niveles de sobrecarga se encuentran dentro del mismo rango.

Conclusiones. El cuidado continúa siendo una tarea de mujeres en edad productiva. Los componentes más afectados a causa del cuidado corresponden al impacto y la indecisión sobre el cuidado.

FACTORES PSICOSOCIALES INFLUYENTES EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA MUJER CON SÍNTOMAS CORONARIOS: REVISIÓN INTEGRATIVA DE LA LITERATURA

Instituciones:

Universidad de Caldas y Universidad Nacional de Colombia

Autora:

Cándida Rosa Castañeda Valencia

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Actualmente las perspectivas del riesgo cardiovascular contemplan las exposiciones psicosociales porque repercuten sobre la morbilidad y mortalidad de las mujeres al interferir con el reconocimiento de los recursos propios para decidir.

Objetivos. Analizar la producción científica literaria en factores psicosociales de riesgo que puedan influenciar la toma de decisiones en las mujeres con enfermedad coronaria (EC).

Metodología. Revisión integrativa de la literatura disponible en el periodo 2001-2017 según la estructura conceptual teórico empírico T-CE y estrategias de práctica basada en evidencia. El proceso sistemático siguió cuatro fases: (1) búsqueda estratégica, (2) acceso a bases de datos, (3) estrategias de crítica, y (4) ordenamiento por nivel de evidencia, análisis integrado, selección de las proposiciones y detección de los vacíos del conocimiento.

Resultados. 129 piezas de investigación aseguran la existencia de múltiples factores psicosociales de riesgo. El análisis crítico decanta 45 artículos que evidencian cuatro factores psicosociales de impacto sobre toma de decisiones en la mujer: (1) experiencias adversas en la infancia, (2) emocionalidad negativa, (3) violencia de pareja y (4) bajo apoyo social.

Conclusión. La revisión afirma que los factores psicosociales de riesgo se han estudiado en forma amplia, aislada y asociados con eventos coronarios. Se conoce poco sobre las influencias agrupadas acerca de la toma de decisiones en mujeres.

OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE LA SENTENCIA C-355 DE 2006

Institución:

Universidad Surcolombiana

Autores:

Eric Yamid Cerquera Gallego, Yessenia Gutiérrez Ocampos, Tania Alejandra Pérez González y Celmira Laza Vásquez

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen

Objetivo. Explorar las opiniones acerca de la sentencia C-355 de 2006 de los estudiantes de último año del Programa de Enfermería de la Universidad Surcolombiana.

Metodología. Estudio cualitativo exploratorio. Participaron 26 estudiantes seleccionados mediante un muestreo por conveniencia hasta saturar la información. Para recolectar la información se utilizaron tres grupos de discusión y cinco entrevistas a profundidad, y esta se analizó mediante análisis de contenido.

Resultados. El patriarcado como impedimento para la implementación de la sentencia en Colombia emergió como tema central en las opiniones de los participantes. Se estableció una fuerte desigualdad e inequidad para las mujeres en el ámbito público y privado, por no reconocerlas como sujetos capaces de tomar decisiones por sí mismas sobre sus vidas, cuerpos, sexualidad y reproducción; otros, generalmente hombres, son quienes lo hacen: Dios, esposos, padres, hermanos y médicos.

Conclusiones. Los fuertes valores patriarcales impregnados en la sociedad son responsables en las dificultades para la implementación de la sentencia, y en esto se articulan otros como la influencia de las iglesias y las acciones del sistema, las instituciones y los profesionales de la salud. Lo anterior genera un fuerte dilema entre “el deber ser” como sujetos sociales permeados por los valores patriarcales y “el hacer” como futuros profesionales.

SIGNIFICADO QUE LOS ADOLESCENTES HOMBRES LE DAN A SU PARTICIPACIÓN EN EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN BOGOTÁ Y MEDELLÍN

Institución:

Universidad El Bosque

Autoras:

Clara Inés Chilatra Guzmán y Diana Milena Cano Arango

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Describir el significado que un grupo de adolescentes hombres escolarizados de Bogotá y Medellín le asigna a su participación en el uso de métodos anticonceptivos.

Metodología. Se realizaron 13 entrevistas semiestructuradas y a profundidad, con estudiantes hombres entre 15 y 19 años que ya hubieran iniciado relaciones sexuales, de dos colegios públicos de Medellín y Bogotá. La muestra fue teórica, por conveniencia, los datos fueron grabados, transcritos y analizados por medio de la reformulación de teoría fundamentada por Strauss y Corbin, priorizando la interpretación y comprensión de significados aportados por los entrevistados.

Resultados. Los participantes de Medellín consideraron los cimientos de hombre y el significado de protegerse como fundamento de su participación en el uso de métodos anticonceptivos; los participantes de Bogotá consideraron la toma de decisiones y el aprendizaje de ser hombre como determinante del aporte masculino al uso de métodos anticonceptivos.

Conclusiones. La participación de los hombres adolescentes en anticoncepción forma parte del inicio de las relaciones coitales, orientada por los aprendizajes sociales de lo masculino, de la información recibida en las instituciones educativas, la familia —especialmente el padre— y sus pares. El desconocimiento sobre los métodos anticonceptivos condiciona su participación y las formas de acompañamiento a la pareja se limita a ideas de apoyo económico, estar de acuerdo con que ella use algún método anticonceptivo, acudir al método de emergencia o al uso del condón de acuerdo con la clase de pareja que se tenga.

EFICACIA DE UNA ESTRATEGIA DE MANEJO DE LOS SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD CORONARIA EN LA MUJER

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Autora:

Claudia Patricia Motta León

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Las mujeres que experimentan síntomas de enfermedad coronaria muestran respuestas como negación, subvaloración y atribución de los síntomas a un origen no cardíaco. Este fenómeno se ha traducido en demora para consultar, disminución de la efectividad de los tratamientos, aparición de complicaciones e incremento de la mortalidad.

Objetivo. Determinar la eficacia de una estrategia de manejo cognitivo de los síntomas de enfermedad coronaria para mejorar las acciones de respuesta y los niveles de autoeficacia general en un grupo de mujeres participantes de un programa de rehabilitación cardíaca en dos instituciones de salud de Bogotá D.C.

Metodología. Diseño tipo ensayo clínico controlado no aleatorizado. El grupo control recibió el manejo habitual del programa de rehabilitación cardíaca, mientras que el grupo experimental recibió la estrategia de manejo de Enfermería elaborada a partir del modelo conceptual del manejo del síntoma de Dodd y colaboradores y de la teoría de rango medio de autoeficacia propuesta por Bárbara Resnick. Esta intervención se realizó en cuatro sesiones con un encuentro semanal. Las acciones de respuesta y los niveles de autoeficacia fueron evaluados al inicio, y dos y cinco semanas después de finalizar la intervención.

Las acciones de respuesta y los niveles de autoeficacia general luego de la aplicación de la estrategia de manejo se mantienen en la medición intermedia y final. Con respecto al desenlace secundario, se demostró que la estrategia de manejo diseñada

e implementada no fue más eficaz que la intervención convencional sobre el puntaje de autoeficacia general obtenido durante las mediciones preliminar, intermedia y posterior. Lo anterior comprueba la importancia de incluir elementos cognitivos y el enfoque de género dentro de los programas de rehabilitación cardíaca.

taba déficit de conocimiento en el tema y no realiza buenas prácticas para su autocuidado, lo cual se reflejó en sus vivencias.

Conclusiones. Como factor protector se encontró que las mujeres presentan buenos hábitos de salud, y como factor de riesgo la poca accesibilidad a los servicios de salud.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN POPAYÁN, CAUCA, 2017

Institución:

Universidad del Cauca

Autores:

Ivett Adriana Herrera Zuleta, Lina Alejandra Embus Lozada y Diego Fernando Albán Fernández

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Describir la salud sexual y reproductiva en las mujeres víctimas del conflicto armado pertenecientes a asociaciones de atención a víctimas en Popayán.

Metodología. Estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal; la muestra fue elegida a conveniencia y estuvo constituida por 60 mujeres que cumplieron los criterios de inclusión establecidos y que aceptaron de manera voluntaria participar, y en constancia de ello firmaron el consentimiento informado. La recolección de la información se realizó por medio de una encuesta semiestructurada autodirigida aplicada por los investigadores, la cual fue diseñada para la investigación y sometida a validez por expertos. La información recolectada se analizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 22.

Resultados. El 93% de las mujeres pertenecía a los estratos socioeconómicos 1 y 2; el rango de edad estuvo entre 18 y 76 años; el 99% de ellas procedía del departamento del Cauca; más del 80% presen-

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO: EXPERIENCIAS DE VIDA

Institución:

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

Autores:

Alexandra Castiblanco, Saulo Molina, Carolina Gamba y Alexandra Alarcón

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Las normatividades mundiales se han generado en pro de disminuir la mortalidad materna por abortos. En Colombia esta acción se encuentra amparada en la sentencia C-355 de 2006, la cual incluye las “malformaciones fetales incompatibles con la vida” como una de sus causales para optar por la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), lo que ha generado una serie de experiencias por las que cursa la mujer en su contexto biopsicosocial.

Objetivo. Describir el impacto y las implicaciones psicosociales que genera la IVE en casos de malformación fetal incompatible con la vida.

Metodología. Estudio cualitativo fenomenológico interpretativo. El muestreo fue por conveniencia y el tamaño de la muestra se determinó por saturación de la información. Se efectuó un análisis interpretativo. Se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas de la resolución 8430 de 1993 para estudios de bajo riesgo.

Resultados. Se incluyeron 10 mujeres con un rango de edad entre los 24 y 31 años, que en promedio accedieron a la IVE a las 22 semanas de gestación.

Los datos recolectados se organizaron en tres categorías finales que dieron cuenta del itinerario de las mujeres para acceder al procedimiento; las dificultades y los efectos para su vida derivados del rechazo social, y la culpabilización por su decisión. *Conclusiones.* Se debe continuar el abordaje de este fenómeno con los diferentes actores implicados para identificar dificultades y fallos en la atención que impidan el acceso a un procedimiento seguro.

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Autor:

Jeffersson Ricardo Contreras Moreno

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. La violencia es una problemática que ha estado presente en la historia del ser humano, en especial la ejercida sexualmente contra la mujer, un flagelo que demanda una atención integral por parte del equipo de salud.

Objetivo. Desarrollar una revisión sistemática que describa la atención de Enfermería en salud mental a mujeres víctimas de violencia sexual.

Material y métodos. Se siguieron los pasos de elaboración descritos por Guerra, Martín y Santos (2003). En la búsqueda se tuvieron en cuenta las siguientes palabras clave tanto en español como en inglés: Enfermería en salud mental AND Violencia sexual AND Mujeres; se realizó una búsqueda exhaustiva de artículos científicos durante los últimos 15 años en diferentes bases de datos como Science Direct, Biblioteca Virtual de Salud (BVS), Elsevier, Scielo, Pubmed, Embase, Redalyc, Elsevier, Medline y OVID Nursing. El límite de la búsqueda de la evidencia científica se estableció

a partir de la saturación de datos identificada en cuando la información se repite, criterio aplicado en el desarrollo de la investigación.

Resultados. Se obtuvieron 21 piezas científicas de diferentes niveles de evidencia, las cuales arrojaron, en primera medida, que no existe una producción muy amplia sobre el fenómeno de estudio por parte de Enfermería; sin embargo se pudo establecer que las intervenciones están dirigidas a lo técnico e instrumental dejando parcialmente a un lado la esfera mental y emocional. Los estudios demuestran que el papel de la Enfermería es vital para el proceso terapéutico y que este debe ir más allá del cumplimiento de protocolo y hacer más integral la atención de Enfermería.

Conclusiones. La formación específica en la atención de víctimas de violencia sexual se debe fortalecer desde la universidad, y se debe actualizar periódicamente. El abordaje de las víctimas va más allá de las intervenciones técnicas e instrumentales y debe considerar aspectos emocionales, psicológicos y mentales enmarcados en el cuidado humanizado.

SIGNIFICADO QUE LAS PUÉRPERAS ASIGNAN A LA EXPERIENCIA DE UNA GESTACIÓN CON PREECLAMPSIA

Institución:

Universidad de Cartagena

Autora:

Belia Luisa Pérez Herrera

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Describir el significado que puérperas atendidas en la Clínica Maternidad Rafael Calvo de Cartagena, en etapa mediata y tardía del posparto, le asignan a la experiencia de una gestación con preeclampsia.

Metodología. Investigación cualitativa, descriptiva interpretativa, muestreo por conveniencia; se realizaron 20 entrevistas a 10 puérperas que estuvieron

hospitalizadas en la Clínica de Maternidad Rafael Calvo de Cartagena en el periodo 2009-2010, para encontrar cómo crean y dan significado a la experiencia de gestación con preeclampsia. El tamaño del muestreo se definió por saturación teórica.

Resultados. Se derivaron cuatro categorías: (1) el embarazo como un proceso normal, (2) reacciones ante el diagnóstico, (3) desinformación parte del proceso, y (4) la esperanza ante la realidad, las cuales se enmarcaron en el tema central de “transitar desde la normalidad de la gestación hacia la experiencia de la preeclampsia”.

Conclusión. Para las puérperas en una gestación con preeclampsia todo parece normal, confían en que están sanas. Cuando conocen el diagnóstico reaccionan con temor por el riesgo de que ella o su hijo puedan morir; experimentan sentimientos perturbadores, generalmente ignorados por los proveedores de salud. Aunque su cuerpo revela la enfermedad, el desconocimiento de los signos y síntomas de alarma las conduce a prácticas de cuidado paliativos y alejados del tratamiento médico y del cuidado de Enfermería; con “el padecimiento” fortalecen su fe, creen en un ser supremo y mantienen el optimismo en la recuperación de ella y su hijo.

Recomendaciones. Aplicar en la práctica de Enfermería propuestas de cuidado que contemplen las categorías surgidas de esta investigación.

Resumen:

Introducción. La violencia contra la mujer durante el embarazo, el parto y el posparto tiene múltiples determinantes y manifestaciones que pueden contribuir a resultados adversos en salud de las madres. **Objetivo.** Identificar el papel de la violencia contra la mujer en la ocurrencia de las muertes maternas en Bogotá.

Metodología. Investigación cualitativa, estudio de series de casos de muertes maternas ocurridas en Bogotá entre 2011 y 2014, cuyos informes evidencian la ocurrencia de actos violentos contra la mujer durante o después de su embarazo.

Resultados. De los 137 casos de muertes maternas, se encontró que nueve de ellos contaron con informes que evidencian manifestaciones de violencia intrafamiliar, principalmente física y psicológica, siendo el hecho violento en algunos casos el que motiva las complicaciones y el fallecimiento de la mujer.

Conclusiones. Aunque se identificaron casos en que la violencia cumplió un papel definitorio de la muerte materna, los reportes de casos no alcanzan a evidenciar la frecuencia y magnitud de la violencia, debido a la ausencia de indagación tanto en el seguimiento prenatal como en las entrevistas a familiares. Para la realización de investigaciones futuras es necesario identificar los tipos de violencias, el seguimiento y la resolución interdisciplinar e intersectorial dados a estos.

EL PAPEL DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA LA MUJER EN LA OCURRENCIA DE LAS MUERTES MATERNAS EN BOGOTÁ D. C.

Institución:

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

Autoras:

Carolina Andrea Vargas Acevedo, Vilma Cenit Fandiño Osorio y Nelly Ester Caliz Romero

Modalidad:

Comunicación oral

PERCEPCIONES FRENTE AL CUIDADO DE MUJERES QUE VIVIERON SITUACIONES DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

Institución:

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

Autoras:

Vilma Cenit Fandiño Osorio, Carolina Andrea Vargas Acevedo y Nelly Ester Caliz Romero

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. El desenlace de los casos de morbilidad materna extrema es un indicador de la calidad de los servicios de salud, y por lo tanto de la acción oportuna y eficiente de los profesionales que los atienden, entre los que se destaca el rol de Enfermería.

Objetivo. Describir la percepción de las mujeres frente al cuidado recibido durante el evento de morbilidad materna extrema.

Metodología. Investigación cualitativa de series de casos de 20 mujeres residentes en Bogotá que en 2014 presentaron un evento de morbilidad materna extrema, seleccionadas mediante muestreo intencional, a quienes se les realizó entrevista semiestructurada. La información fue procesada mediante Atlas ti versión 7.5.

Resultados. Según las narrativas, uno de los factores más destacado en el desenlace de su gestación fue la acción de los profesionales de la salud, de la cual por su oportunidad, asertividad y comunicación con la mujer fueron elementos determinantes valorados tanto positiva como negativamente por las mujeres.

Conclusión. Aunque desde la perspectiva de las investigadoras se identifica la presencia del profesional de Enfermería durante el embarazo, en general las mujeres no identificaron quién era la enfermera y cuáles sus funciones y aportes.

Resumen:

Introducción. La enfermedad coronaria (EC) se considera como la pandemia más importante del siglo XXI, y en Colombia ocupa el primer lugar como causa de mortalidad en la población femenina.

Objetivo. Describir las características de los síntomas de angina en un grupo de mujeres hospitalizadas en la Clínica San Juan de Dios, de cuarto nivel, en el marco de la teoría de Lenz y cols.

Metodología. Estudio de tipo descriptivo exploratorio con abordaje cualitativo. La información se obtuvo mediante entrevista semiestructurada a un grupo de mujeres postsíndrome coronario agudo, la cual se sometió a la técnica de análisis de contenido. Las principales respuestas arrojadas fueron: “Cuando cojo rabia me da el dolor”, “Yo pienso que es el estrés y la vida que estoy llevando”, “He sido una mujer sufrida”, “Respiraba y no alcanzaba”, “Me sentía apretada y no podía respirar”, “Dolor que ahoga”, “Ya no soy la misma”, “Estoy llevada”, “Tengo que llevar la vida más suave”, “Vamos pa la clínica, porque yo ya no alcanzo”, “. . .yo de mi cuenta tomo”.

Resultados. Las mujeres estudiadas muestran un perfil en el que priorizan a los demás, se sobrecargan de tareas y satisfacen las necesidades del otro. Conclusiones. Las participantes del estudio pertenecen a una población que a consecuencia de las condiciones del medio en que viven, están en una situación de mayor susceptibilidad al daño, sumado esto, la condición de su enfermedad se hace aún más evidente, llevando a un estado de vulnerabilidad.

CARACTERIZACIÓN DE LOS SÍNTOMAS DE ANGINA EN MUJERES HOSPITALIZADAS EN LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS DE CARTAGENA

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Autoras:

Milena Medrano y Fanny Rincón

Modalidad:

Comunicación oral

CONOCIMIENTOS QUE TIENE EL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LA LACTANCIA MATERNA (LM) EN EL SERVICIO DE OBSTETRICIA DE UNA CLÍNICA PRIVADA DE MEDELLÍN

Institución:

Universidad Pontificia Bolivariana

Autoras:

Hsirley Calderón Bejarano, Dora Isabel Giraldo Montoya y Claudia Patricia Henao López

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Identificar los conocimientos y las prácticas que tiene el personal de Enfermería sobre la LM en el servicio de Obstetricia.

Metodología. Estudio descriptivo transversal realizado en 2016. Muestra conformada por todo el personal de Enfermería (n: 71), del servicio de alto riesgo obstétrico, partos y posparto. Se utilizó una encuesta elaborada por las investigadoras y evaluada por expertos en la formulación de preguntas. Las variables de conocimientos analizadas fueron: bases anatómicas y fisiológicas; manejo de las afecciones del pecho; razones médicas aceptables para el uso de sucedáneos; diez pasos hacia una LM exitosa y cómo ayudar a la madre que tiene problemas. Se contabilizó el número de respuestas correctas e incorrectas y se calcularon medidas de frecuencias absolutas y relativas. Se utilizó el programa IBM SPSS versión 22.

Resultados. La mayoría del personal presentó respuestas incorrectas en fisiología, manejo de las afecciones del pecho, razones médicas aceptables para el uso de sucedáneos y cómo ayudar a la madre con problemas durante la LM. Se observaron más respuestas correctas en la estrategia de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAM).

Conclusiones. La mayoría del personal de enfermería presentó respuestas incorrectas en los temas relacionados con la LM.

Autores:

Luisa Fernanda Acosta Franco, Marla Andrea Zambrano Álvarez, Óscar Yesid Cely Masias y Raquel Vargas Vásquez

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. La violencia obstétrica es una forma de violencia que afecta a las mujeres en edad reproductiva, afectando negativamente su salud física y emocional. La violencia obstétrica vulnera los derechos humanos de las mujeres que la han padecido.

Objetivo. Determinar las formas de violencia obstétrica y la percepción tanto de las mujeres víctimas como del personal de salud.

Metodología. Se realizó una revisión integrativa en las bases de datos de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), Science Direct y Scopus Medline.

Resultados. A pesar de la legislación vigente, la violencia obstétrica es un fenómeno presente en las instituciones de salud y es infringida más frecuentemente por el personal de salud más cercano: obstetras y enfermeras. Muchas de las mujeres y el mismo personal de salud desconocen la norma, por lo que siguen incurriendo en actos violentos que van desde el maltrato verbal hasta episiotomías innecesarias y sin consentimiento.

Conclusión. La violencia obstétrica es prevenible por medio del trato humanizado. Después de la revisión y con base en la evidencia científica apropiada en el estudio se realizó una propuesta de intervención para prevenir la violencia obstétrica por parte de las enfermeras.

ROL DE LA ENFERMERÍA FRENTE A LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO, EL PARTO Y EL POSPARTO INMEDIATO

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

PREPARACIÓN PARA LA MATERNIDAD DURANTE LA GESTACIÓN. UN ANÁLISIS DE CONCEPTO

Institución:

Universidad Pontificia Bolivariana

Autor:

Jhon Henry Osorio Castaño

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. La maternidad es un proceso construido social y culturalmente. Una de las teorías más recientes que explica la maternidad como proceso es la de “convertirse en madre”, de Ramona Mercer, constituida por cuatro estadios, entre ellos compromiso, vínculo y preparación.

Objetivo. Identificar los componentes de la preparación para la maternidad durante la gestación a partir del análisis de este concepto.

Metodología. Se utilizó la propuesta de Walker y Avant. Se realizó una búsqueda de artículos en la literatura científica. Como criterio fundamental para la inclusión de los artículos se definió que la preparación hubiese sido central. Se integró la información a partir de los ocho pasos.

Resultados. Para el análisis se incluyeron 33 fuentes. El concepto se define como un proceso de participación activa, consciente y positivo delimitado por el contexto social, histórico y cultural que permite generar cambios en el estilo de vida para optimizar la salud, cuyos atributos se clasifican en preparación psicológica y preparación física.

Conclusiones. Comprender la preparación para la maternidad durante la gestación provee un camino para ampliar las intervenciones de cuidado más allá de los asuntos biomédicos.

Resumen:

Introducción. El embarazo y el parto son procesos fisiológicos normales únicos en la vida de las mujeres. Para disminuir las complicaciones que se pudieran presentar, o incluso la muerte materna durante este proceso, la mujer requiere de acompañamiento por parte de la familia, y de vigilancia del personal de salud.

Objetivo. Conocer las prácticas que las enfermeras realizan durante la atención a la mujer en el trabajo de parto institucionalizado y de esta manera hacer visible el conocimiento que la enfermera profesional tiene sobre las prácticas que realiza en torno a la atención de parto y que reproducen la violencia obstétrica.

Metodología. La investigación es de tipo cualitativa con un enfoque fenomenológico.

Resultados. Este trabajo describe dos categorías: “herencia de la formación en Enfermería” y “prácticas condicionadas por la institución”.

Resultados. Las prácticas de cuidado realizadas a la mujer durante el trabajo de parto en las instituciones de salud responden a acciones rutinarias desarrolladas tradicionalmente, aunadas al cumplimiento de lineamientos y programas de las instituciones. No obstante, se vislumbra que existen prácticas de cuidado autónomas que las enfermeras realizan y que están vinculadas a su profesionalización.

LAS PRÁCTICAS DE LAS ENFERMERAS DURANTE LA ATENCIÓN A LA MUJER EN EL TRABAJO DE PARTO

Institución:

Universidad Nacional Autónoma de México

Autora:

María del Rosario Cortés García

Modalidad:

Póster

FACTORES FAMILIARES ASOCIADOS CON LOS CONOCIMIENTOS Y LA FRECUENCIA CORRECTA DEL AUTOEXAMEN DE MAMA EN MUJERES DEL ÁREA RURAL DE CARTAGENA

Institución:

Universidad de Cartagena

Autoras:

Cristina Elena Bohórquez Moreno, Irma Yolanda Castillo Ávila y Jhoselys Palomino Blanquicett

Modalidad:

Póster

Resumen:

Objetivo. Determinar los factores familiares asociados con los conocimientos y la frecuencia correcta del autoexamen de mama en mujeres del área rural de Cartagena.

Metodología. Estudio analítico en el que participaron 779 mujeres mayores de 20 años del área rural de Cartagena, Colombia. Se evaluaron las variables sociodemográficas, familiares, los conocimientos y la práctica del autoexamen de mama.

Resultados. El promedio de edad de las participantes fue de $33,6 \pm 8,9$ años, el 54,25% tiene una pareja estable, el 34,7% ha cursado bachillerato completo, el 52,9% pertenece a familias nucleares y además se perciben como normofuncionales.

En cuanto a los conocimientos del autoexamen de mama, el 73% de las encuestas conoce cómo se realiza, pero el 49% de estas nunca se lo ha realizado. Se encontró que el 31,1% de las mujeres que conviven con máximo cuatro personas presentan mejores conocimientos del autoexamen con respecto a las que conviven con más de cuatro personas. Por último se evidenció que la funcionalidad familiar influye en la realización regular de este procedimiento.

Conclusiones. Los conocimientos del autoexamen de mama muestran mejor tendencia entre las mujeres que viven en entornos familiares más adecuados, lo que favorece su realización regular.

EXPERIENCIA DE LAS MUJERES PRIMÍPARAS EN LA ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONALIZADO

Institución:

Universidad Nacional Autónoma de México

Autores:

Verónica Ordóñez Ambrosio y Marco Antonio Cardoso Gómez

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. La atención y el cuidado del embarazo y del parto han existido desde siempre, y esa tarea se le ha conferido principalmente a la mujer; es por eso que las parteras se ocupaban de atender a las mujeres durante el embarazo y el parto. Más adelante los médicos se ocuparon de este cuidado, y estos procesos naturales dejaron de ser algo fisiológico para convertirse en algo patológico que requiere cuidados especializados. Por consiguiente, la experiencia que se vive por vez primera se vuelve traumática y tiene consecuencias en la salud tanto de la mujer como de su familia.

La relevancia de este estudio es la escasa evidencia científica sobre este tema en Ciudad de México.

Objetivo. Describir la experiencia de las mujeres primíparas en la atención del parto institucionalizado y analizar los significados que ellas le dan a la experiencia de tener un hijo por primera vez en una institución de salud.

Metodología. Estudio cualitativo, con perspectiva fenomenológica descriptiva. Participantes: mujeres primíparas que hayan tenido el trabajo de parto y el parto en una institución de salud pública de la CDMX. El muestreo fue tomado intencionalmente, por medio de entrevistas semiestructuradas a profundidad, las cuales fueron grabadas y transcritas. Se realizó un análisis por unidad significativa de análisis.

Resultados. Las mujeres participantes del estudio reconocen las siguientes categorías derivadas de la experiencia de su atención del parto en una institución de salud: (C1) Detección de signos de alarma, (C2) Buena atención (C3) sentimientos encontrados al conocer a su hijo.

Conclusiones. Las mujeres primíparas experimentan el trabajo de parto de diferente manera y viven violencia obstétrica; sin embargo califican una buena atención, conciben la violencia como algo normal y que así debe de ser.

CATEGORÍA: CUIDADO AL RECIÉN NACIDO

SIGNIFICADO DEL CUIDADO MATERNO CULTURAL DEL NIÑO CON OXÍGENO DOMICILIARIO

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Autora:

Sara María Morales Castellanos

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivo. Describir el significado del cuidado materno cultural del niño prematuro o de bajo peso al nacer (BPN) con oxígeno domiciliario.

Materiales y métodos. Estudio de tipo cualitativo con abordaje etnográfico, realizado en un Programa Canguro ambulatorio de un hospital de Bogotá. En la investigación participaron ocho madres, previo consentimiento informado y aprobación. La muestra fue saturada con 21 entrevistas grabadas en los hogares, y transcritas textualmente. Para la recolección y análisis de la información se usó la teoría de la diversidad y de la universalidad de los cuidados culturales de Madeleine Leininger y la entrevista a profundidad de James Spradley.

Resultados. El significado que le asignan las madres al cuidado del niño con oxígeno domiciliario es descrito en nueve dominios: el oxígeno como una necesidad vital; conocimientos culturales; conocimientos y educación sobre la administración de oxígeno domiciliario; trámites y sus dificultades; el desplazamiento de la madre con el niño prematuro con oxígeno domiciliario; higiene y vestido; aumento de los costos; participación del padre y familiar; y alteración de las emociones maternas.

Conclusiones. Las madres entienden que cuidar al niño con oxígeno domiciliario significa “estar pendiente” y “tener cuidado”, e interpretan el oxígeno como una necesidad vital.

CATEGORÍA: ADMINISTRACIÓN EN SALUD Y ENFERMERÍA

PERCEPCIÓN DE LA CULTURA EN SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UNA UNIDAD DE ATENCIÓN DE BOGOTÁ

Institución:

Fundación Universitaria del Área Andina

Autores:

Jhonny Walit Cruz Riveros y Martha Cecilia Veloza

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. El clima de seguridad del paciente es un elemento fundamental dentro de la implementación de la política nacional de seguridad del paciente y un insumo para alcanzar su mejora. Una de las estrategias contenidas en la implementación de la política es la medición de la cultura de la seguridad del paciente.

Objetivo. Conocer la percepción de la cultura de la seguridad del paciente por parte del personal de Enfermería.

Metodología. Estudio descriptivo con enfoque cuantitativo, para el cual se utilizó el instrumento elaborado por la Agency For Health Care Research and Quality (AHRQ), aplicado a 43 profesionales de Enfermería de una Unidad de Atención de Salud de Bogotá.

Resultados. Las dimensiones que se constituyen en fortaleza para mejorar el clima de seguridad en una unidad de salud, son: trabajo en equipo en la unidad/servicio; aprendizaje organizacional/mejora continua; expectativas y acciones de la dirección/supervisión de la unidad/servicio que favorecen la seguridad. Las dimensiones etiquetadas como oportunidad de mejora, fueron: dotación de personal y respuesta no punitiva a los errores.

Conclusiones. Aunque los lineamientos recomiendan la aplicación del instrumento como estrategia para implementar la cultura de seguridad, es necesario observar de forma objetiva las dinámicas de los servicios para obtener una mayor aproximación a la realidad.

FACTORES ASOCIADOS CON LAS CAÍDAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS CON ENFOQUE EN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN TRES HOSPITALES COLOMBIANOS DE ALTA COMPLEJIDAD ENTRE 2014 Y 2016

Institución:

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

Autores:

Guillermo Sánchez Vanegas, Diana Viancha, Mónica Quemba, Eliana González y Catalina Pérez

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. Las caídas son eventos adversos de alta frecuencia e impacto en los pacientes y sus familias, que se convierten en un indicador de la calidad de la atención de los hospitales.

Objetivo. Establecer los factores de riesgo de caída intrahospitalaria con enfoque en el cuidado de Enfermería en tres instituciones de alta complejidad de Colombia.

Materiales y métodos. Estudio de casos y controles: los casos correspondieron a pacientes que hubieran presentado caída durante la estancia hospitalaria, y los controles se seleccionaron de los pacientes atendidos en el periodo que no hubiesen presentado el evento. Se calculó un tamaño de muestra de 270 casos y 270 controles; para el análisis se calcularon OR y se realizó un modelo de regresión logística.

Resultados. Se incluyeron 690 pacientes, de los cuales el 58% eran hombres y el 77% provenía de zonas urbanas. Se identificaron varios factores asociados de caída en el modelo de regresión, como la presencia de catéter venoso periférico (OR 2,92 IC 95% 1,01-8,43), medidas de sujeción/sedación (OR 2,35 IC 95% 1,1-4,9), días de estancia (OR 2,85 IC 95% 2,0-4,0), medicamentos de alto riesgo (OR 2,82 IC 95% 1,86-4,28), paciente colaborado (OR 1,61 IC 95% 0,8-3,0) y acompañante permanente (OR 2,68 IC 95% 1,87-3,83).

Conclusiones. Se identificaron factores relacionados con el cuidado de Enfermería que pueden ser

intervenidos en las instituciones y probablemente podrían disminuir el riesgo de caída.

COMPORTAMIENTO DE LA RESISTENCIA DE ACINETOBACTER SPP. A CARBAPENÉMICOS TIPO MEROPENEM Y MEDIDAS DE CONTENCIÓN A LO LARGO DEL TIEMPO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO

Institución:

Pontificia Universidad Javeriana

Autores:

David Andrade Fonseca

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Objetivos. Caracterizar el comportamiento del fenómeno de resistencia del *Acinetobacter spp.* al Meropenem en pacientes hospitalizados en el Hospital Universitario de San Ignacio (HUSI) en el periodo 2004-2013, e identificar el impacto de las actividades de contención realizadas durante el periodo de estudio.

Métodos. Estudio descriptivo-longitudinal, tipo serie de tiempo interrumpida, realizado en el HUSI, de Bogotá.

La muestra estuvo conformada por 364 pacientes hospitalizados en el HUSI en el periodo de noviembre de 2004 a diciembre de 2013, que tuvieron cultivo positivo para *Acinetobacter* y en quienes se realizó antibiograma para Meropenem.

Resultados. El 35,4% de la población estudiada tuvo diagnóstico de bacteremia por *Acinetobacter*; el 44,5% tuvo estancia en la unidad de cuidados intensivos (UCI); el 68,8% de la población estudiada presentó resistencia a Meropenem. Durante el periodo del estudio se evaluó el impacto de las intervenciones de contención de resistencia por medio de una serie de tiempo interrumpida en la que no se obtuvo ningún hallazgo estadísticamente significativo que modificara la serie temporal.

Conclusiones. El estudio realizado no permitió identificar posibles impactos que modifican el patrón de resistencia según las estrategias implementadas en el periodo de estudio. Tanto los pacientes sometidos a cirugías como los que tuvieron estancia hospitalaria prolongada fueron los que presentaron infección por *Acinetobacter* spp. con mayor frecuencia. La mitad de los pacientes colonizados o infectados por *Acinetobacter* que ingresaron al HUSI generaron resistencia al Meropenem.

PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS ACERCA DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

Institución:

Universidad Antonio Nariño

Autores:

Olga Patricia Melo Barbosa y David Eduardo Daza Ortiz

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. En los procesos de mejora continua de la calidad de atención que prestan los servicios de salud se tiene en cuenta la percepción de los usuarios acerca de la calidad de la atención de Enfermería; su evaluación permite que se generen estrategias para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios en beneficio de alcanzar la satisfacción del usuario durante el proceso de atención.

Objetivo. Analizar la percepción de los usuarios en relación con la calidad de la atención recibida por Enfermería en el periodo 2010-2016 a partir de la evidencia científica disponible.

Metodología. Se realizó una revisión de la literatura en tres diferentes bases de datos: Pubmed, EBSCO y base de datos de la Universidad Antonio Nariño; de estas se seleccionaron los artículos completos publicados entre 2010 y 2016 sin importar su metodología e idioma, y se encontraron 50 artículos

que fueron sometidos a un análisis inicial, del que resultaron 32 artículos viables para desarrollar el objetivo de esta revisión.

Resultados. Los 32 artículos finalmente seleccionados se analizaron en profundidad resaltando y tomando la información relevante y surgieron cuatro categorías: (1) percepción de los usuarios frente a la calidad de la atención de Enfermería, (2) satisfacción, necesidades y expectativas de los usuarios frente a la atención de Enfermería, (3) instrumentos de recolección y análisis de datos, y (4) estrategias que mejoran la calidad de la atención.

Conclusión. La percepción de los usuarios de los servicios de salud frente a la calidad de atención de Enfermería fue satisfactoria en diferentes servicios asistenciales. Es importante que el equipo de Enfermería reconozca las necesidades y expectativas de los usuarios con el fin de garantizar una atención de calidad, individualizada y humanizada.

CALIDAD DE LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA: ESTRUCTURA, CONTINUIDAD DEL CUIDADO Y SEGURIDAD DEL PACIENTE DE EXPEDIENTES CLÍNICOS DE QUEJA MÉDICA

Institución:

Universidad Nacional Autónoma de México

Autoras:

Denny Contreras Guerrero y Reyna Matus Miranda

Modalidad:

Póster

Resumen:

Introducción. Los registros clínicos de Enfermería son un documento médico legal que proporciona información de la atención del paciente. En México la Conamed es una institución que tiene la facultad de dar una opinión técnica respecto a una queja médica.

Objetivo. Analizar el nivel de calidad de los registros de Enfermería en sus dimensiones: estruc-

tura, continuidad del cuidado y seguridad del paciente en expediente clínicos de queja médica de la Conamed.

Metodología. Estudio descriptivo, correlacional y retrospectivo. Muestra probabilística de 210 registros clínicos de Enfermería de expedientes de queja médica. Se utilizó un instrumento con la confiabilidad Kuder Richardson $r = 0,89$. Se realizaron análisis descriptivos e inferenciales.

Resultados. La calidad de los registros de Enfermería fue del 50%, lo que la coloca en un nivel mínimo. Con respecto a la calidad, en la dimensión de “estructura” esta fue del 62%, “continuidad del cuidado” 50% y “seguridad del paciente” un 38%, por lo que las tres dimensiones se colocan en “No cumplimiento”.

CATEGORÍA: CONDICIONES DE TRABAJO

SÍNDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE HOSPITALES DEL ATLÁNTICO

Institución:

Universidad del Norte

Autores:

Roxana de las Salas, Daniela Díaz Agudelo, Dolores Serrano, Stefanny Ortega, Rafael Tüesca y Carolina Gutiérrez

Modalidad:

Póster

Resumen:

Objetivo. Determinar la prevalencia del Síndrome de Burnout en el personal de Enfermería en cuatro hospitales del departamento del Atlántico (Colombia).

Metodología. Estudio descriptivo transversal que incluyó 117 profesionales y 229 auxiliares de Enfermería de cuatro hospitales del Atlántico, dos públicos y dos privados. Se empleó una encuesta autodiligenciada anónima sobre características sociodemográficas, laborales y la escala de Maslach. **Resultados.** La prevalencia global del Síndrome de Burnout o desgaste profesional fue del 65%. En profesionales de Enfermería fue del 63,2% y en auxiliares de Enfermería del 65,9%. El 13,3% de los encuestados presentó un grado elevado de Burnout para el cansancio emocional, el 9,2% para la despersonalización y el 62,7% obtuvo puntuaciones bajas para la realización personal.

En los profesionales de Enfermería, el 12,7% obtuvo una puntuación alta para cansancio emocional, 7,4% para despersonalización y 64,2% obtuvo puntuaciones bajas para la realización personal. Por su parte, en los auxiliares de Enfermería el comportamiento en algunas subescalas fue muy similar, el 14,5% obtuvo una puntuación alta para cansancio emocional, 12,8% para despersonalización y 59,8% con puntuaciones bajas para la realización personal.

Conclusiones. La presencia del Síndrome de Burnout en la población estudiada es alta; es similar tanto en enfermeros como en auxiliares de Enfermería. La dimensión más afectada fue la realización personal en ambos grupos estudiados, lo cual corresponde a sentimientos altos del “quemado”.

profesional sanitario. Es preciso delimitar algunas funciones, recuperar campos de acción, afianzar el liderazgo, la autonomía y recuperar la humanización en la prestación de los servicios.

ROL DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN EL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO

Institución:

Universidad Antonio Nariño

Autoras:

Oneys del Carmen de Arco Canoles y Zuleima Karina Suarez Calle

Modalidad:

Póster

Resumen:

Objetivo. Identificar en la evidencia científica publicada en el periodo 2011-2017 el rol de los profesionales de Enfermería en el sistema de salud.

Método. La búsqueda bibliográfica se realizó durante el primer trimestre de 2017, en las bases de datos Scielo, Pubmed, Redalyc y ScienceDirect, se seleccionaron artículos con texto completo en español e inglés que presentaron en el título los siguientes descriptores: “enfermería” “rol de enfermería” “sistemas de salud” “práctica avanzada del profesional”.

Resultados. Se seleccionaron 50 estudios publicados entre 2011 y 2017, se usaron 17 artículos de 2011 que estudiaron los sistemas de salud en Latinoamérica, con ello se buscó orientar el rol de Enfermería; resultaron tres categorías de interés, así: prácticas en el ámbito hospitalario; prácticas en el ámbito comunitario, y gestión docencia e investigación.

Conclusión. A pesar de la importancia del rol que desempeñan los profesionales de Enfermería en Colombia, no se observa una diferenciación de los perfiles y las funciones dentro del equipo

CATEGORÍA: CUIDADOS PERIOPERATORIO

PREVALENCIA DE CIRUGÍAS REALIZADAS, CAUSAS, REINGRESOS Y MORTALIDAD EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE COLOMBIA

Institución:

Universidad Nacional de Colombia

Autores:

Wilmar José López Zuluaga, Karen Tatiana Roa Lizcano y Renata Virginia González Consuegra

Modalidad:

Comunicación oral

Resumen:

Introducción. En Colombia no existen estudios que describan indicadores y prevalencia relacionadas con intervenciones quirúrgicas, reingresos, mortalidad y morbilidad.

Objetivo. Establecer y caracterizar la prevalencia de procedimientos quirúrgicos en una IPS de tercer nivel de Bogotá.

Metodología. Estudio cuantitativo, descriptivo y retrospectivo en un hospital del tercer nivel de complejidad. Se incluyeron pacientes de todas las edades, sometidos a cirugía durante doce meses. Se contó con aval institucional.

El análisis estadístico se realizó mediante estadística descriptiva utilizando la herramienta Epiinfo como soporte para el procesamiento de datos.

Resultados. Prevalencia y tipos de cirugías, morbilidad, readmisión y mortalidad.

Se espera que estos resultados sirvan para orientar las prácticas de atención según la población actual, sean insumo para la generación de intervenciones dirigidas a mejorar la seguridad y las condiciones de atención durante el proceso quirúrgico y mejoren la práctica de la Enfermería durante el proceso perioperatorio.

XXIII Coloquio Nacional de Investigación de Enfermería

**Enfermería y posconflicto:
cuidado para la salud y la calidad de vida**

Memorias

Fue editado y publicado por la Editorial Universidad El Bosque. Diciembre de 2017
Bogotá D.C., Colombia